

令和6年度定期予防接種（施行計画）

鹿児島県保健福祉部感染症対策課(施行日:令和6年4月1日)

| 類型               | 対象疾病  | 対象年齢等<br>(施行令)                | 標準的な接種期間<br>(実施要領)             | 接種ワクチン<br>及び接種量                  | 回数   | 間隔<br>(実施規則)           | 標準間隔<br>(実施要領)      | 方法                    | 備考                   |  |
|------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--|
| A<br>類<br>疾<br>病 | ジフテリア<br>百日せき<br>破傷風<br>急性灰白<br>髄炎<br>(ポリオ)<br>Hib感染症 | 1期<br>初回                      | 生後2月から生後90<br>月に至るまでの間に<br>ある者 | 生後2月に達した時<br>～生後7月に達する<br>までの期間  | 沈降精製百日せきジフテ<br>リア破傷風不活化ポリオ<br>ヘモフィルスb型混合ワク<br>チン(DPT-IPV-Hib)  | 3回                     | 20日以上               | 20日～56日               | 筋肉<br>又は<br>皮下<br>注射 | ○生後2月以降にできるだけ早期に接種を開始する。<br>○皮下接種の場合は上腕伸側(外側)、筋肉内注射の場合は三角筋部又は<br>大腿四頭筋部(ただし、乳児にあつては三角筋部ではなく大腿四頭筋部)にそ<br>れぞれ行う。<br>○第1期の予防接種の初回接種においては、DPT-IPV-Hib, DPT-IPV, DPT<br>又はDTのうちから、使用するワクチンを選択することが可能な場合であっても、<br>原則として、同一種類のワクチンを必要回数接種すること。<br><br>＜Hib感染症＞<br>Hib感染症の定期接種として、乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを使用する場合は初回接<br>種の開始時の月齢ごとに接種回数を減じることとされているが、5種混合ワクチンを使<br>用する場合はこの接種回数を減じる取扱いは不要であることに留意する。  |
|                  |   | 1期<br>追加                      | 生後2月から生後90<br>月に至るまでの間に<br>ある者 | —                                | 毎回 0.5ml   | 1回                     | 初回接種終<br>了後6月以<br>上 | 初回接種終<br>了後6月～<br>18月 |                      |  |
|                  | ジフテリア<br>百日せき<br>破傷風<br>急性灰白<br>髄炎<br>(ポリオ)           | 1期<br>初回                      | 生後2月から生後90<br>月に至るまでの間に<br>ある者 | 生後2月に達した時<br>～生後12月に達する<br>までの期間 | 沈降精製百日せきジフテ<br>リア破傷風不活化ポリオ<br>混合ワクチン(DPT-IPV)、<br>沈降精製百日せきジフテ<br>リア破傷風混合ワクチン<br>(DPT)、<br>沈降ジフテリア破傷風混合ト<br>キソイド(DT) (DTトキソイ<br>ドを使用する場合は1期<br>初回は2回接種) | 3回                     | 20日以上               | 20日～56日               | 皮下<br>注射             | ○生後2月以降にできるだけ早期に接種を開始する。<br>○皮下深く接種することで局所反応を軽減する。<br><br>＜不活化ポリオワクチン＞<br>○対象者の確認について<br>・原則として、平成24年9月1日より前の接種歴に応じた接種回数とすることから、予防<br>接種台帳による確認や保護者からの聞き取り等を十分行い、接種歴の把握に努めるこ<br>と。<br>○対象者の特例について<br>・平成24年9月1日より前に経口生ポリオワクチンを1回接種した者については、平成24<br>年9月1日以降は、不活化ポリオの初回接種を1回受けたものとみなす。<br>・平成24年9月1日より前に経口生ポリオワクチンを2回接種した者は、定期接種として<br>受けることはできない。<br><br>＜接種間隔緩和に伴う経過措置について＞<br>ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の予防接種について、平成26<br>年4月1日より前に、「間隔を超えたための任意接種」を実施したことについ<br>ても、医師の判断と保護者の同意に基づき、既に接種した回数分の定期接種を<br>受けたものとしてみなすことができる。ただし、過去の任意接種を定期接種と<br>して取り扱うわけではなく、新規則施行後に予防接種を実施する場合の考え方<br>についての規定である。 |
| 1期<br>追加         | 生後2月から生後90<br>月に至るまでの間に<br>ある者                        | —                             | 毎回 0.5ml                       | 1回                               | 初回接種終<br>了後6月以<br>上  | 初回接種終<br>了後12月～<br>18月 |                     |                       |                      |  |
| 2期               | 11歳以上13歳未満の<br>者                                      | 11歳に達した時～12<br>歳に達するまでの期<br>間 | 沈降ジフテリア破傷風混合<br>トキソイド(DT)      | 0.1ml                            | 1回   | —                      | —                   |                       |                      |  |

| 類型     | 対象疾病             | 対象年齢等<br>(施行令)                 | 標準的な接種期間<br>(実施要領)   | 接種ワクチン<br>及び接種量                 | 回数                       | 間隔<br>(実施規則)                  | 標準間隔<br>(実施要領)               | 方法       | 備考   |  |
|--------|------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------|--|--|
| A<br>類 | H i b<br>感染症     | 生後2月から生後60<br>月に至るまでの間に<br>ある者 | —  | 乾燥ヘモフィルスb型<br>ワクチン<br><br>0.5ml | 初回3回<br>(生後12月ま<br>でに完了) | 初回:27(医師<br>が認める場合<br>は20)日以上 | 27(医師が認<br>める場合は<br>20)日~56日 | 皮下<br>注射 | ○初回接種開始時に生後2月から生後7月<br>に至るまでの間にある者<br>○上記対象者に対する方法を標準的な接種<br>方法とすること。<br>○ただし、初回接種のうち2回目及び3回<br>目の接種は、生後12月に至るまでに行<br>うこととし、それを超えた場合は行わな<br>いこと。この場合、追加接種は実施可<br>能であるが、初回接種に係る最後の注<br>射終了後、27日(医師が必要と認め<br>た場合には20日)以上の間隔をおい<br>て1回行うこと。 |  |
|        |                  |                                |  |                                 | 追加1回                     | 追加:初回接<br>種終了後7月<br>以上        | 初回接種終了<br>後7月~13月            |          |  |  |
|        |                  |                                |  |                                 | 初回2回<br>(生後12月ま<br>でに完了) | 初回:27(医師<br>が認める場合<br>は20)日以上 | 27(医師が認<br>める場合は<br>20)日~56日 |          |  | ○初回接種開始時に生後7月に至った<br>日の翌日から生後12月に至るまでの<br>間にある者<br>○ただし、初回2回目の接種は、生後<br>12月に至るまでに行うこととし、そ<br>れを超えた場合は行わないこと。この<br>場合、追加接種は実施可能であるが、<br>初回接種に係る最後の注射終了後、<br>27日(医師が必要と認めた場合には<br>20日)以上の間隔をおいて1回行う<br>こと。 |
|        |                  |                                |  |                                 | 追加1回                     | 追加:初回接<br>種終了後7月<br>以上        | 初回接種終了<br>後7月~13月            |          |  |  |
|        |                  |                                |  |                                 | 1回                       | —                             | —                            |          | ○初回接種開始時に生後12月に至った<br>日の翌日から生後60月に至るまでの<br>間にある者   |  |
|        |                  |                                |  |                                 | /                        |                               |                              |          | <接種間隔緩和に伴う経過措置について><br>Hib感染症の予防接種について、平成<br>26年4月1日より前に、「間隔を超えた<br>ための任意接種」を実施したことにつ<br>いても、医師の判断と保護者の同意に<br>基づき、既に接種した回数分の定期接<br>種を受けたものとしてみなすことがで<br>きる。ただし、過去の任意接種を定期<br>接種として取り扱うわけではなく、新<br>規則施行後に予防接種を実施する場合<br>の考え方についての規定である。   |  |
| 疾<br>病 | 麻しん<br>及び<br>風しん | 1期                             | 生後12月から生後24<br>月に至るまでの間に<br>ある者  | —                               | 1回                       |                               |                              | 皮下<br>注射 | ○1期の予防接種は、できるだけ早期<br>に接種する。<br>○麻しん及び風しんを同時に行う場合<br>は、MR混合ワクチンを使用する。<br>○一度溶解したワクチンは、ウイルス<br>力価減少を避けるために直ちに使用す<br>る。   |  |
|        |                  | 2期                             | 5歳以上7歳未満の者であ<br>って、小学校就学の始<br>期に達する日の1年前の<br>日から当該始期に達す<br>る日の前日までの間に<br>あるもの(小学校就学<br>前の1年間にある者)                                  | —                               | 1回                       | —                             | —                            |          |  |  |
|        |                  | 5期                             | 昭和37年4月2日から昭<br>和54年4月1日の間に<br>生まれた男性(風しん<br>に係る抗体検査を受け<br>た結果、十分な量の<br>風しんの抗体がある<br>ことが判明し、当該<br>予防接種を行う必要<br>がないと認められる<br>者を除く。) | —                               | 毎回 0.5ml                 | 1回                            | —                            | —        | 皮下<br>注射   |  |

| 類型 | 対象疾病           | 対象年齢等<br>(施行令)                 | 標準的な接種期間<br>(実施要領)  | 接種ワクチン<br>及び接種量   | 回数                                   | 間隔<br>(実施規則) | 標準間隔<br>(実施要領)      | 方法                    | 備考   |                |                                |   |   |                          |                                       |   |                                   |   |
|----|----------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|--|----------------|--------------------------------|---|---|--------------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| A  | 日本脳炎           | 1期<br>初回                       | 生後6月から生後90<br>月に至るまでの間に<br>ある者  | 3歳に達した時～4歳<br>に達するまでの期間   | 乾燥細胞培養<br>日本脳炎ワクチン<br>毎回 0.5ml(3歳以上) | 2回           | 6日以上                | 6日～28日                | 皮下<br>注射<br><br>○日本脳炎の定期の予防接種の積極的な接種勧奨の取り扱いについて<br>・平成29年度から令和6年度までの間、当該年度に18歳となる者について、年<br>度毎に、2期接種の積極的勧奨を行う。<br>・その他、積極的勧奨の差し控えが行われた期間に定期の予防接種の対象者<br>であった者のうち、1期接種を完了している者に対しては、市町村長等が実施<br>可能な範囲で、2期接種の積極的勧奨を行っても差し支えない。<br>※「日本脳炎の定期の予防接種に係る積極的な接種勧奨の取扱い等につい<br>て(平成29年1月31日付け厚生労働省事務連絡)」参照 |                |                                |   |   |                          |                                       |   |                                   |   |
|    |                | 1期<br>追加                       | 生後6月から生後90<br>月に至るまでの間に<br>ある者  | 4歳に達した時～5歳に<br>達するまでの期間   | 0.25ml(3歳未満)                         | 1回           | 初回接種終<br>了後6月以<br>上 | 初回接種終<br>了後おおむ<br>ね1年 |  |                |                                |   |   |                          |                                       |   |                                   |   |
|    |                | 2期                             | 9歳以上13歳未満の<br>者   | 9歳に達した時～10<br>歳に達するまでの期<br>間                                    | 乾燥細胞培養<br>日本脳炎ワクチン<br>0.5ml          | 1回           | —                   | —                     |  |                |                                |   |   |                          |                                       |   |                                   |   |
| 類  | 結核             | 1歳に至るまでの間に<br>ある者              | 生後5月に達した時<br>～生後8月に達する<br>までの期間   | BCGワクチン<br>所定のスポイトで滴下   | 1回                                   | —            | —                   | 経皮<br>接種              | ○接種部位は上腕外側のほぼ中央部とし、肩峰に近い部分はケロイド発生率<br>が高いので避けなければならない。<br>○管針法は、接種部位の皮膚を緊張させ、懸濁液を塗った後、九本針植付け<br>の管針を接種皮膚面に対してほぼ垂直に保ち、これを強く圧して行う。<br>○接種数は、二箇所とし管針の円跡は相互に接する。   |                |                                |   |   |                          |                                       |   |                                   |   |
|    |                |                                |   |   |                                      |              |                     |                       |  | 小児の肺炎球菌<br>感染症 | 生後2月から生後60<br>月に至るまでの間に<br>ある者 | ＜初回接種＞<br>初回接種開始時に<br>生後2月～7月に<br>至るまでの間<br><br>＜追加接種＞<br>初回接種開始時に<br>生後2～7月に至<br>るまでの間にある<br>者は生後12月～15<br>月 | 沈降15価肺炎球菌結合<br>型ワクチン<br>又は<br>沈降13価肺炎球菌結合<br>型ワクチン<br><br>0.5ml | 初回3回<br>(生後24月ま<br>でに完了) | 初回:27日<br>以上                          | — | 沈降<br>15価<br>筋肉<br>又は<br>皮下<br>注射 | ○初回接種開始時に生後2月から生後7月に至るまでの間にある者<br>○上記対象者に対する方法を標準的な接種方法とする。<br>○ただし、初回2回目及び3回目の接種は、生後24月に至るまでに行<br>うこととし、それを超えた場合は行わないこと(追加接種は実施可<br>能)。また、初回2回目の接種は生後12月に至るまでに行うことと<br>し、それを超えた場合は、初回3回目の接種は行わないこと(追加接<br>種は実施可能)。 |
|    |                |                                |   |   |                                      |              |                     |                       |  |                |                                |   |   | 追加1回                     | 追加:初回終<br>了後60日以上<br>の間隔かつ生<br>後12月以降 | — |                                   |   |
| 病  | 小児の肺炎球菌<br>感染症 | 生後2月から生後60<br>月に至るまでの間に<br>ある者 | ＜初回接種＞<br>初回接種開始時に<br>生後2月～7月に<br>至るまでの間<br><br>＜追加接種＞<br>初回接種開始時に<br>生後2～7月に至<br>るまでの間にある<br>者は生後12月～15<br>月 | 沈降15価肺炎球菌結合<br>型ワクチン<br>又は<br>沈降13価肺炎球菌結合<br>型ワクチン<br><br>0.5ml | 2回                                   | 60日以上        | —                   | 沈降<br>13価<br>皮下<br>注射 | ○初回接種開始時に生後12月に至った日の翌日から生後24月に至るま<br>での間にある者   |                |                                |   |   |                          |                                       |   |                                   |   |
|    |                |                                |   |   | 1回                                   | —            | —                   |                       | ○初回接種開始時に生後24月に至った日の翌日から生後60月に至るま<br>での間にある者   |                |                                |   |   |                          |                                       |   |                                   |   |
|    |                |                                |   |   |                                      |              |                     |                       | 原則として沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンを使用することとするが、当面の<br>間、沈降13価肺炎球菌結合型ワクチンも使用できる。また、沈降13価肺炎球<br>菌結合型ワクチンを使用して1回目、2回目又は3回目までの接種を終了した<br>者の接種について、残りの接種を沈降15価肺炎球菌結合型ワクチンを用いて<br>行うことができる。  |                |                                |   |   |                          |                                       |   |                                   |   |



| 類型               | 対象疾病   | 対象年齢等<br>(施行令)                          | 標準的な接種期間<br>(実施要領)                | 接種ワクチン<br>及び接種量                         | 回数 | 間隔<br>(実施規則)                            | 標準間隔<br>(実施要領) | 方法   | 備考   |
|------------------|--------|---|-----------------------------------|---|----|---|----------------|------|--|
| A<br>類<br>疾<br>病 | B型肝炎   | 平成28年4月1日以後に生まれた、生後1歳に至るまでの間にある者        | 生後2月に至った時から生後9月に至るまでの期間           | 組換え沈降B型肝炎ワクチン<br><br>0.25ml             | 3回 | 2回目:1回目の接種から27日以上<br>3回目:1回目の接種から139日以上 | —              | 皮下注射 | <p>&lt;対象者から除外される者&gt;</p> <p>HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者については、定期接種の対象者から除く。</p> <p>&lt;平成28年10月1日より前の接種の取扱い&gt;</p> <p>平成28年10月1日より前の注射であって、定期の予防接種のB型肝炎の注射に相当するものについては、当該注射を定期の予防接種のB型肝炎の注射と、当該注射を受けた者については、定期の予防接種のB型肝炎の注射を受けた者とみなして、以降の接種を行うこと。</p>   |
|                  | ロタウイルス | 令和2年8月1日以後に生まれた、生後6週0日後から24週0日後までの間にある者 | <初回接種><br>生後2月に至った日から出生14週6日後までの間 | 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(ロタリックス®)<br><br>1.5ml | 2回 | 27日以上                                   | —              | 経口投与 | <p>○出生15週0日後以降の初回接種については安全性が確立されておらず、出生14週6日後までに初回接種を完了させることが望ましい。出生15週0日後以降に初回接種を行う場合は、上記について十分に説明を行い、同意が得られた場合に接種する。</p> <p>○原則として同一ワクチンを接種する。ただし1回又は2回投与した後に転居した際、転居後の定期接種を実施する市町村において、いずれか一方の接種しか実施していない等の理由により、原則によることができないやむを得ない事情があると当該市町村長が認める場合にはこの限りではない。</p> <p>○接種後吐き出した場合でも追加接種はしない。</p> <p>&lt;対象者から除外される者&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・腸重積症の既往歴のあることが明らかな者。</li> <li>・先天性消化管障害を有する者（その治療が完了した者を除く）。</li> <li>・重症複合免疫不全症の所見が認められる者。</li> </ul> <p>&lt;令和2年10月1日より前の接種の取扱い&gt;</p> <p>令和2年10月1日より前の経口投与であって、定期接種の経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン又は5価経口弱毒生ロタウイルスワクチンの経口投与に相当するものについては、当該経口投与をロタウイルス感染症の定期接種と、また当該経口投与を受けた者については、定期接種のロタウイルス感染症の経口投与を受けた者とみなして、以降の経口投与を行う。</p> |
|                  |        | 令和2年8月1日以後に生まれた、生後6週0日後から32週0日後までの間にある者 |                                   | 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン(ロタテック®)<br><br>2.0ml  | 3回 | 27日以上                                   | —              | 経口投与 |  |

| 類型               | 対象疾病             | 対象年齢等<br>(施行令)   | 標準的な接種期間<br>(実施要領) | 接種ワクチン<br>及び接種量                        | 回数 | 間隔<br>(実施規則) | 標準間隔<br>(実施要領) | 方法                   | 備考  |
|------------------|------------------|--|--------------------|--|----|--------------|----------------|----------------------|---|
| B<br>類<br>疾<br>病 | インフルエンザ          | ①65歳以上の者<br>②60歳以上65歳未満<br>の者であって、心臓、腎<br>臓又は呼吸器の機能<br>に自己の身の日常<br>生活活動が極度に制<br>限される程度の障害<br>を有する者及びヒト免<br>疫不全ウイルスにより免<br>疫の機能に日常生活<br>がほとんど不可能な<br>程度の障害を有する<br>者 | -                  | インフルエンザHAワクチ<br>ン<br><br>0.5ml         | 1回 | -            | -              | 皮下<br>注射             | ○B類疾病の予防接種を受ける努力義務は無く、かつ、自らの意志で接種を<br>希望する者のみに接種を行うものであることをあらかじめ明示すること。   |
|                  | 高齢者の肺炎球<br>菌感染症  | ①65歳の者<br>②60歳以上65歳未満<br>の者であって、心臓、腎<br>臓又は呼吸器の機能<br>に自己の身の日常<br>生活活動が極度に制<br>限される程度の障害<br>を有する者及びヒト免<br>疫不全ウイルスにより免<br>疫の機能に日常生活<br>がほとんど不可能な<br>程度のの障害を有す<br>る者  | -                  | 23価肺炎球菌莢膜ポリ<br>サッカライドワクチン<br><br>0.5ml | 1回 | -            | -              | 筋肉<br>又は<br>皮下<br>注射 | ○B類疾病の予防接種を受ける努力義務は無く、かつ、自らの意志で接種を<br>希望する者のみに接種を行うものであることをあらかじめ明示すること。<br><対象者から除外される者><br>これまでに、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者<br>は、定期接種として受けることはできないこと。 |
|                  | 新型コロナウイルス<br>感染症 | ①65歳以上の者<br>②60歳以上65歳未満<br>の者であって、心臓、腎<br>臓又は呼吸器の機能<br>に自己の身の日常<br>生活活動が極度に制<br>限される程度の障害<br>を有する者及びヒト免<br>疫不全ウイルスにより免<br>疫の機能に日常生活<br>がほとんど不可能な<br>程度の障害を有する<br>者 | -                  | 別途厚生労働省より通知                            | 1回 | -            | -              | 筋肉<br>注射             | ○B類疾病の予防接種を受ける努力義務は無く、かつ、自らの意志で接種を<br>希望する者のみに接種を行うものであることをあらかじめ明示すること。   |

(注)本計画は、予防接種法第5条、同施行規則第1条の2に基づくものである。