

ア) 移植水稲

除草剤名	成分名	移植時 (田植同時散布)	適用雑草																
			一年生		キシ ユウ スズ メノ ヒエ	ウ リ カ ワ	オ モ ダ カ	ク ロ グ ワ イ	コ ウ キ ヤ ガ ラ	セ リ	ヒ ル ム シ ロ	ヘ ラ オ モ ダ カ	ホ タ ル イ	マ ツ バ イ	ミ ズ ガ ヤ ツ リ	藻類 による 表層は く離	ア オ ミ ド ロ		
			イ ネ 科	非 イ ネ 科															
初・ 中 期 剤	ジェイフレンドジャンボ	オキサジ [®] クロメホン テフルトリオン ビ [®] ラクロニル		○	○		○	○	○		○	○	○	○	○				
	シグナスジャンボ	テフルトリオン フェントラサ [®] ミト [®] メタゾ [®] スルフロン		○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○				
	デオレー1キロ粒剤	オキサジ [®] クロメホン テフルトリオン メタゾ [®] スルフロン	○	○	○	多年生広葉雑草													
	ドリフ1キロ粒剤	トリアフェモン フェントラサ [®] ミト [®] クロメフ [®] ロップ [®] エトキシスルフロン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	ビクトリーZジャンボ	ビ [®] ラクロニル プロビ [®] リスルフロン		○	○	多年生広葉雑草											○	○	
	マサラオ1キロ粒剤	イマゾ [®] スルフロン ビ [®] リミノ [®] バックメチル フェンキナトリオン	○	○	○	多年生広葉雑草											○	○	
	銀河1キロ粒剤	ダ [®] イムロン ビ [®] ラクロニル メタゾ [®] スルフロン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	デオレージャンボ	メタゾ [®] スルフロン オキサジ [®] クロメホン テフルトリオン		○	○	多年生広葉雑草													
	移植直後～ ノビエ3.5葉期 まで	カウンシルエナジー1キロ粒 剤/アバンティ1キロ粒剤	トリアフェモン フェンキナトリオン フェントラサ [®] ミト [®]	○	○	○	多年生雑草												
		カウンシルエナジージャンボ/ アバンティジャンボ	トリアフェモン フェンキナトリオン フェントラサ [®] ミト [®]		○	○	多年生雑草												
		カウンシルエナジーフロアブ ル/アバンティフロアブル	トリアフェモン フェンキナトリオン フェントラサ [®] ミト [®]	○	○	○	多年生雑草												
		カウンシルコンプリート1キロ粒 剤/ポデーガードプロ1キロ粒剤	テフルトリオン トリアフェモン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		ジャスタ1キロ粒剤/ クサウェポン1キロ粒 剤	シクロピ [®] リモレート トリアフェモン ビ [®] ラゾ [®] レート	○	○	○	多年生雑草											○	○
		ジャスタフロアブル/ クサウェポンフロアブル	シクロピ [®] リモレート トリアフェモン ビ [®] ラゾ [®] レート	○	○	○	多年生雑草											○	○
		プライオリティジャンボ	トリアフェモン フェンキナトリオン		○	○	多年生雑草												
プライオリティ豆つぶ250		トリアフェモン フェンキナトリオン		○	○	多年生雑草													
移植後15日～ ノビエ3.5葉期 但し、収穫60日 前まで	ハイカット1キロ粒剤	シハロホップ [®] フ [®] チル ジ [®] メタトリン ハロスルフロンメチル ペンゾ [®] ビ [®] シクロ		○	○	○	多年生広葉雑草											○	○

ア) 移植水稲

除草剤名	成分名	移植時 (田植同時散布)	適用雑草													アオミドロ		
			一年生		キシユウスズメノヒエ	ウリカワ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	セリ	ヒルムシロ	ヘラオモダカ	ホタルイ	マツバイ	ミズガヤツリ		藻類による表層はく離	
			イネ科	非イネ科														
移植直後～ ノビエ4葉期 まで	アシュラジャンボ	トリアフェモン ビ [®] ラクロニル ベンゾビ [®] シクロン	○	○	多	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アシュラ400FG	トリアフェモン ビ [®] ラクロニル ベンゾビ [®] シクロン	○	○	多	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アシュラ1キロ粒剤	トリアフェモン ビ [®] ラクロニル ベンゾビ [®] シクロン	○	○	○	多	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	アシュラフロアブル	トリアフェモン ビ [®] ラクロニル ベンゾビ [®] シクロン	○	○	○	多	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
移植後3日～ ノビエ4葉期 まで。	ゼータプラスジャンボ	フェンキナトリオン プロピ [®] リスルフロン	○	○														多年生広葉雑草
移植後7日～ ノビエ4葉期まで 但し、収穫45日 前まで	アクシズMX1キロ粒剤	ビ [®] リフカリト [®] メソトリオン メタゾ [®] スルフロン	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
移植後7日～ノビエ 4葉期まで 但し、収穫60日前 まで	ウィードコア1キロ粒剤	フロルビ [®] ラキシフェンベンジ [®] ル パ [®] ノキススラム ベンゾビ [®] シクロン	○	○	○													多年生広葉雑草
移植後7日～ ノビエ4葉期 但し、収穫30日 前まで	クリンチャー1キロ粒剤	シハロホップ [®] フ [®] チル	ノ [®] ア		○													
移植後14日～ ノビエ4葉期 但し、収穫60日 前まで	ツイゲキ1キロ粒剤	シメトリン ビ [®] リスルファン フェンキナトリオン	○	○														多年生広葉雑草
	レプラスジャンボ	ジ [®] メタトリン タ [®] イムロン テフルトリオン メタゾ [®] スルフロン	○	○														多年生雑草
移植後15日～ ノビエ4葉期 但し、収穫45日 前まで	ワイドショット1キロ粒剤	テフルトリオン パ [®] ノキススラム	○	○		○	○	○		○	○	○	○	○	○			
移植後14日～ ノビエ5葉期 但し、収穫50日 前まで	トドメMF1キロ粒剤	メタミホップ [®]	ノ [®] ア		○													
移植後15日～ ノビエ5葉期 但し、収穫50日 前まで	クリンチャーバスME液剤	シハロホップ [®] フ [®] チル ベンゾゾ [®] ナトリウム塩	○	○	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○			
移植後20日～ ノビエ5葉期 但し、収穫45日前 まで出穂始期15日 前まで	アレイルSC	メタゾ [®] スルフロン ハロスルフロンメチル	○	○														多年生広葉雑草
移植後20日～ ノビエ5葉期 但し、収穫45日 前まで	ロイヤント乳剤	フロルビ [®] ラキシフェンベンジ [®] ル	ノ [®] ア	○		○	○			○					○	○		

中・後期一発剤

ア) 移植水稲

除草剤名	成分名	移植時 (田植同時散布)	適用雑草																
			一年生		キシユウスズメノヒエ	ウリカワ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	セリ	ヒルムシロ	ヘラオモダカ	ホタルイ	マツバイ	ミズガヤツリ	藻類による表層はく離	アオミドロ		
			イネ科	非イネ科															
移植後15日～ノビエ6葉期 但し、収穫50日前まで	トドメバスMF液剤	ヘンタゾン メタホップ	○	○															
移植後20日～ノビエ6葉期 但し、収穫30日前まで	クリンチャーEW	シハホップ [®] フ [®] チル	ノ	ア	○														
移植後20日(稲5葉期以降)～ノビエ6葉期 但し、収穫30日前まで	ワイドアタックSC	ヘノキスラム	○	○															
移植後14～60日 但し、収穫45日前まで	バイスコープ1キロ粒剤/ ルナクロス1キロ粒剤	シクロ [®] リモレート テフルトリオン		(ノビエ除)○	○	○	○	○					○	○		○			
移植後15～55日 但し、収穫50日前まで	バサグラン液剤(ナトリウム塩)	ヘンタゾ [®] ナトリウム塩		○	○	○	○	○				○	○	○	○				
移植後15～55日 但し、収穫60日前まで	バサグラン粒剤(ナトリウム塩)	ヘンタゾ [®] ナトリウム塩		○	○	○	○					○	○	○	○				
有効分けつ 終止期～幼穂 形成期前 但し、収穫60日前まで	粒状水中2,4-D	2,4-PAエチル																	
イネ科類、藻類の発生 始～発生盛期 但し、収穫45日前まで	モグトン粒剤	ACN																○	
藻類・表層はく離の 発生時 但し、収穫45日前まで																			○
ウリカワの増殖初期 (2～4葉期) 但し、収穫45日前まで							○												
ヒルムシロの発生始 ～増殖始 但し、収穫45日前まで													○						

注1) 粒剤で1キロ剤と3キロ剤の2種類があるものは1キロ剤のみ記載。

注2) ノはノビエのみの登録。ノアはノビエとアゼガヤに登録。

注3) 多は多年生イネ科雑草登録

イ) 直播水稲

除草剤名	成分名	は種時 (同時散布)	適用雑草														
			一年生		キシユウスズメノヒエ	ウリカワ	オモダカ	クログワイ	コウキヤガラ	セリ	ヒルムシロ	ヘラオモダカ	ホタルイ	マツバイ	ミズガヤツリ	藻類による表層はく離	
			イネ科	非イネ科													
は種時, は種直後～ノビエ 1.5葉期まで 但し, 収穫90日 前まで 【砂壌土～ 壤土】	サンバード粒剤	ピラゾレート	○	○	○		○							○	○	○	
稲1葉期～ ノビエ2.5葉期 但し, 収穫90日 前まで 【砂壌土～ 壤土】	ザークD 1 キロ粒剤 5 1	ダイムロン ベンズルフロメチル メフェナセト		○	○											○	
は種後10日～ ノビエ3葉期, 但し, 収穫30日 前まで は種後25日～ ノビエ4葉期 但し, 収穫30日 前まで	クリンチャー 1 キロ粒剤	シロホップ プチル															
は種時 は種直後 は種直後～稲出 芽前 稲3葉期～ノビエ4 葉期 但し, 収 穫45日前まで	ヒエクリーン 1 キロ粒剤	ピリミホバックメチル	○		ノ												
稲1葉期～ ノビエ4葉期 但し, 収穫45日 前まで	フルチャージジャンボ	カルフェントラゾソエチル フルセトスルフロ		○	○		○					○	○		○	○	
播種後10日～ ノビエ5葉期 但し, 収穫50日前 まで	クリンチャーバスマE液剤	シロホップ プチル ペンタゾソナトリウム塩		○	○		○							○	○	○	○
播種後10日～ ノビエ5葉期 但し, 収穫30日前 まで	クリンチャーEW	シロホップ プチル		○													
播種後35日～50日 但し, 収穫50日前 まで	バサグラン液剤(ナトリウム塩)	ペンタゾソナトリウム塩			○		○	○	○					○	○	○	○

1. ノはノビエのみの登録。

