

作物名	病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)			発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%、頭、枚)				備考		
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25			本年	前年		評価	平年
カンキツ	そうか病 (春葉)	やや少	やや少	奄美	0	0	0	6					100	0	14	0	14	14	14	0	0	0	0	100葉当り発病葉率	奄美	0.0	0.0	並	(0.1)	
カンキツ	かいよう病 (春葉)	並	並	奄美	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100葉当り発病葉率	奄美	0.0	0.0	並	(0.0)	
カンキツ	ミカンハダニ	並	やや多	奄美	63	14	14	9				14	86	0	0	0	14	14	14	14	0	14	14	100葉当り寄生葉率	奄美	2.0	0.1	多	(0.2)	瀬戸内町：少1
カンキツ	赤衣病	-	-	奄美	63	14	-	-				14	86									0	0	10樹当り発病有無	奄美					奄美市名瀬 1

※その他特記事項

●調査地点

7ほ場調査【名瀬3、住用2、瀬戸内2】調査品目は全てタンカン

※ 栽培面積 443ha (中晩柑類:411ha、その他32ha) (「果樹生産統計資料(令和5年産実績)」(令和7年3月 県農産園芸課)から出典)

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」の発生程度を加味したものである。