

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2026年（令和8年）4/10～17日調査

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%、頭、枚)				備考								
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	本年	評価	平年										
																									本年		評価	平年						
炭疽病	-	-	南薩	1,712	38	-				38	63																	1㎡当り	南薩	4.9		(0.0)	少：谷場2, 後岳2, 枕崎1, 伊集院2, さつま2	
		-	北薩	147	10	-				10	90																	病葉数	北薩	0.2		(0.0)		
		-	大隅	0	0	-					100																			大隅	0.0			(0.0)
		-	県計	1,859	23	-				23	77																		県平均	2.4		(0.0)		
○チャノココク モンハマキ	並	並	南薩	0	0	1				100	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.02)		
		並	北薩	0	0	0				100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	虫数	北薩	0.0	並	(0)		
		並	大隅	0	0	1				100	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.03)		
		並	県計	0	0	1				100	0	0	7	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		県平均	0.0	並	(0.01)		
○チャハマキ	やや少	やや少	南薩	0	0	4				100	0	6	0	6	0	6	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	やや少	(0.08)			
		並	北薩	0	0	3				100	0	0	0	0	0	0	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	虫数	北薩	0.0	並	(0)			
		並	大隅	0	0	1				100	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.03)			
		やや少	県計	0	0	3				100	0	4	0	7	0	3	15	4	0	0	0	0	0	0	0	0		県平均	0.0	やや少	(0.13)			
○チャノホソガ	多	やや多	南薩	856	19	8				19	81	0	0	19	0	18	29	0	6	6	0	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	1.3	多	(0.3)	少：菊水1, 枕崎1, 出水1, 曾於1, 野井倉2, 原田2, 鹿屋1, 錦江2		
		やや多	北薩	294	20	12				20	80	0	0	0	20	0	20	30	20	10	20	0	0	0	0	0		北薩	0.7	やや多	(0.43)			
		多	大隅	1,434	75	14				75	25	38	0	0	0	13	13	13	0	50	13	0	0	0	0	0		大隅	2.9	多	(0.5)			
		多	県計	2,584	33	10				33	67	9	0	11	4	13	24	9	7	17	7	0	0	0	0	0	0		県平均	1.5	多		(0.4)	
○チャノミドリ ヒメヨコバイ	少	少	南薩	285	6	30				6	94	38	19	56	13	35	35	17	29	38	19	0	0	0	0	0	4ヶ所叩き	南薩	0.1	やや少	(0.8)	少：枕崎1, 野井倉1, 原田1, 錦江2		
		少	北薩	0	0	28				100	10	10	30	30	40	50	40	50	10	10	10	0	0	0	0	0		北薩	0.0	やや少	(0.7)			
		多	大隅	956	50	25				50	50	38	13	25	0	13	38	38	38	13	38	0	0	0	0	0		大隅	1.5	多	(0.4)			
		少	県計	1,241	16	28				16	84	33	16	44	13	30	39	26	35	26	22	0	0	0	0	0		県平均	0.4	やや少	(0.7)			
○チャノキイロ アザミウマ	並	やや少	南薩	285	6	17				6	94	44	38	25	0	29	12	0	18	0	6	0	0	0	0	0	4ヶ所叩き	南薩	0.1	やや少	(0.6)	少：菊水1, 溝辺1, 野井倉1, 原田2, 錦江2		
		やや少	北薩	147	10	18				10	90	40	40	10	30	10	0	20	20	10	0	0	0	0	0	0		北薩	0	やや少	(0.3)			
		やや多	大隅	956	50	34				50	50	0	63	38	25	50	38	38	38	25	25	0	0	0	0	0		大隅	0.6	並	(1.0)			
		並	県計	1,389	17	21				17	83	32	44	25	12	31	16	13	23	8	10	0	0	0	0	0		県平均	0.2	やや少	(0.6)			
○カンザワハダニ	多	やや多	南薩	1,997	44	25				13	31	56	31	38	13	56	18	6	17	12	13	44	0	0	0	0	0	寄生葉率	南薩	2.3	やや多	(1.3)	少：谷場1, 青戸1, 南さつま1, 川辺2, 伊集院2, 溝辺1, 野井倉1, 原田1, 鹿屋1, 錦江1 中：さつま2 多：出水1, 牧園2	
		やや多	北薩	1,325	90	73			40	20	30	10	60	90	70	60	70	80	80	100	70	50	0	0	0	0	0		北薩	24.8	多	(6.3)		
		並	大隅	956	50	49				50	50	0	100	75	63	25	38	75	38	38	38	0	0	0	0	0		大隅	2.6	並	(6.7)			
		やや多	県計	4,278	54	39			7	11	36	46	29	63	38	58	28	27	42	34	29	43	0	0	0	0	0		県平均	9.0	多	(4.0)		
チャトゲコナ ジラム	-	-	南薩	1,997	44	-				44	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	38	0	0	0	0	0	寄生葉率	南薩	1.1	-	-	少：谷場1, 青戸1, 後岳1, 南さつま1, 川辺1, 伊集院2, 溝辺2, さつま1, 牧園1, 曾於1, 原田1, 鹿屋2, 錦江1 中：さつま1, 牧園1, 曾於1	
		-	北薩	1,030	70	-			30	40	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	90	0	0	0	0		北薩	8.2	-	-		
		-	大隅	1,195	63	-				63	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	63	0	0	0	0		大隅	2.3	-	-		
		-	県計	4,223	53	-			6	48	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	53	0	0	0	0		県平均	3.4	-	-		

※その他特記事項

南薩：薩摩中南部 4,565ha 8地点16ほ場 【南九州市穎娃町牧之内(谷場)②・穎娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】  
 北薩：川内川中流域・霧島山麓 1,472ha 6地点 10ほ場 【南さつま市加世田内山田(東山)②、枕崎市別府(中原)②、日置市伊集院町古城(飯牟礼)②】  
 大隅：大隅中南部 1,912ha 4地点 8ほ場 【さつま町船木(舟木)②、出水市平和町②、霧島市溝辺町麓(論地)②、霧島市牧園町三体堂②、曾於市末吉町岩崎②】  
 県計(鹿毛・大島除く) 7,949ha (R6) 18地点34ほ場 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②、鹿屋市東原町②、錦江町城元②】  
 ※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。