

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%、頭、枚)				備考	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25			本年	評価		平年
○炭疽病	多	やや多	南薩	3,138	69	49			13	56	31	56	38	50	31	88	41	53	53	38	44	1㎡当り	南薩	30.3	多	(7.9)	中：谷場1, 菊永1, 溝辺1, 牧園1 少：青戸1, 後岳2, 東山2, 川辺2, 伊集院2, さつま2, 出水1, 溝辺1, 牧園1, 末吉2, 原田1, 鹿屋1,
		やや多	北薩	1,325	90	63			20	70	10	70	20	70	20	60	80	100	70	70	病葉数	北薩	36.4	多	(8.5)		
		やや少	大隅	478	25	43				25	75	63	0	63	0	63	63	63	38	50	25		大隅	5.9	並	(5.2)	
		やや多	県計	4,941	62	50			11	51	38	60	25	57	22	77	53	64	52	46	44	県平均	26.4	多	(7.5)		
○輪斑病	やや少	少	南薩	0	0	12				100	19	0	13	6	24	18	12	0	6	25	1㎡当り	南薩	0.0	やや少	(0.4)	少：溝辺1, 牧園2, 原田1	
		並	北薩	442	30	28				30	70	10	20	20	10	50	30	60	40	30	10	病葉数	北薩	1.2	並		(1.2)
		並	大隅	239	13	15				13	88	13	0	0	0	13	25	25	25	25	25		大隅	0.1	やや少		(0.9)
		やや少	県計	681	9	16				9	91	16	4	11	5	25	22	24	13	15	22	県平均	0.4	やや少	(0.7)		
もち病	やや少	やや少	南薩	0	0	4				100	6	0	0	0	0	0	24	0	6	6	1㎡当り	南薩	0.0	並	(1.0)		
		やや少	北薩	0	0	3				100	10	0	0	0	0	0	10	10	0	0	病葉数	北薩	0.0	並	(0.4)		
		並	大隅	0	0	5				100	38	13	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0.0	並	(0.8)		
		やや少	県計	0	0	4				100	15	3	0	0	0	0	15	2	4	4	県平均	0.0	並	(0.8)			

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2026年(令和8年)6/12~18日調査

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%、頭、枚)				備考	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	本年	評価	平年			
○チャノコカク モンハマキ	多	多	南薩	856	19	4				19	81	0	0	0	0	6	0	0	6	19	13	1㎡当り 虫数	南薩	0.3	多	(0.09)	中：原田1 少：青戸2, 枕崎1, 野井倉1, 原田1
		やや少	北薩	0	0	9				100	20	10	0	10	0	10	0	0	0	0	40		北薩	0.0	やや少	(0.4)	
		多	大隅	717	38	6			13	25	63	13	13	0	13	0	13	0	0	13	0		大隅	1.4	多	(0.06)	
		多	県計	1,573	20	6			3	17	80	7	5	0	5	3	5	0	3	14	15		県平均	0.5	多	(0.2)	
○チャハマキ	並	並	南薩	571	13	11			13	88	0	6	6	0	35	12	0	24	25	6	1㎡当り 虫数	南薩	0.1	並	(0.29)	少：青戸1, 後岳1, 牧園2	
		多	北薩	294	20	3			20	80	0	0	0	0	20	0	10	0	0	0		北薩	0.7	多	(0.14)		
		やや少	大隅	0	0	4			100	0	0	0	0	0	13	0	0	0	13	13		大隅	0.0	やや少	(0)		
		並	県計	865	11	8			11	89	0	4	4	0	24	10	0	15	17	7		県平均	0.3	並	(0.19)		
○チャノホソガ	やや多	並	南薩	571	13	12			13	88	6	0	38	6	18	12	6	6	0	31	1㎡当り 巻葉数	南薩	0.3	並	(0.3)	中：牧園1 少：伊集院2, 出水2, 牧園1, 末吉2, 鹿屋2	
		やや多	北薩	883	60	44		10	50	40	30	60	30	30	40	20	30	70	80	50		北薩	10.7	多	(3.9)		
		やや多	大隅	478	25	15			25	75	13	25	0	13	13	13	25	13	13	25		大隅	1.6	多	(0.4)		
		やや多	県計	1,932	24	19		2	22	76	12	17	27	12	20	13	15	19	18	33		県平均	3.6	多	(1.4)		
○チャノミドリ ヒメヨコバイ	並	やや少	南薩	2,568	56	70			56	44	56	75	69	75	82	65	65	41	88	81	4ヶ所叩き 落とし虫数	南薩	1.0	やや少	(2.4)	中：末吉2 少：青戸1, 菊永1, 後岳2, 東山2, 川辺1, 伊集院2, さつま2, 出水2, 溝辺1, 末吉2, 野井倉1, 牧園2, 原田1, 鹿屋2, 錦江2	
		やや多	北薩	1,325	90	74		20	70	10	70	60	60	70	90	60	80	100	70	80		北薩	5.5	やや多	(4.6)		
		やや多	大隅	1,434	75	65			75	25	63	88	38	88	50	75	38	63	75	75		大隅	1.9	並	(2.2)		
		並	県計	5,327	67	69		4	63	33	60	75	59	77	76	66	61	57	81	80		県平均	2.5	やや少	(3.0)		
○チャノキイロ アザミウマ	少	少	南薩	1,141	25	70			25	75	94	88	88	56	88	41	35	100	50	63	4ヶ所叩き 落とし虫数	南薩	0.6	やや少	(6.5)	少：谷場1, 青戸1, 伊集院2, さつま1, 出水2, 末吉2, 原田1, 鹿屋2,	
		少	北薩	736	50	77			50	50	100	100	70	60	60	80	50	80	90	80		北薩	3.9	並	(5.4)		
		少	大隅	717	38	68			38	63	75	75	38	75	38	75	50	88	75	88		大隅	2.1	やや少	(5.8)		
		少	県計	2,594	33	71			33	67	90	87	72	62	71	56	42	93	63	72		県平均	1.9	やや少	(6.0)		
カンザワハダニ	多	多	南薩	1,997	44	16			44	56	6	0	19	31	65	0	12	6	13	13	寄生葉率	南薩	1.1	やや多	(0.5)	中：末吉2, 原田1 少：青戸1, 菊永1, 枕崎2, 東山2, 川辺1, 牧園1, 原田1	
		並	北薩	442	30	31			20	10	70	40	70	30	30	30	20	20	20	30		20	北薩	4.1	多		(1.8)
		多	大隅	478	25	10			13	13	75	13	13	0	13	0	13	0	13	25		大隅	2.6	多	(0.3)		
		多	県計	2,917	37	18		7	30	63	14	16	16	26	43	7	13	7	16	17		県平均	2.4	多	(0.8)		
クワシロ カイガラムシ	少	やや少	南薩	0	0	14			100	15	21	29	8	35	8	4	4	3	13	寄生株率	南薩	0.0	やや少	(4.2)	少：さつま2, 錦江3 ※クワシロカイガラムシは1地点4ほ場調査		
		少	北薩	147	10	32			10	90	50	30	30	27	47	47	47	23	20		0	北薩	0.0	少		(17.8)	
		少	大隅	359	19	28			19	81	29	29	29	29	17	38	29	25	31		25	大隅	0.0	少		(8.2)	
		少	県計	506	6	21			6	94	25	25	29	17	33	22	18	13	13		13	県平均	0.0	少		(9.1)	
ツマグロアオ カスミカメ	やや多	多	南薩	1,141	25	10			25	75	6	6	6	6	12	24	12	0	13	19	1㎡当り 被害芽数	南薩	0.4	並	(0.5)	少：青戸1, 菊永1, 後岳1, 枕崎1, 出水1, 牧園2, 末吉2, 野井倉1, 原田2	
		多	北薩	736	50	11			50	50	0	20	0	10	0	10	0	40	30	0		北薩	4.6	多	(0.9)		
		多	大隅	717	38	9			38	63	0	25	0	13	13	13	0	25	0	0		大隅	0.6	並	(0.4)		
		多	県計	2,594	33	10			33	67	4	13	4	8	10	18	7	13	13	11		県平均	1.7	やや多	(0.6)		
チャトゲコナジラ ミ	並	やや少	南薩	856	19	44			19	81	-	-	-	-	-	-	-	-	82	50	0	寄生葉率	南薩	0.8	やや少	(4.5)	中：牧園2, 末吉2 少：青戸1, 枕崎1, 川辺1, さつま2, 野井倉2, 原田1, 錦江2
		やや少	北薩	883	60	67		40	20	40	-	-	-	-	-	-	-	-	70	60	70		北薩	19.2	やや多	(14.5)	
		やや多	大隅	1,195	63	46			63	38	-	-	-	-	-	-	-	-	75	25	38		大隅	1.8	やや少	(10.2)	
		並	県計	2,934	37	49		7	30	63	-	-	-	-	-	-	-	-	78	46	22		県平均	6.4	並	(8.7)	

※その他特記事項

南薩：薩摩中南部 4,565ha 8地点16ほ場 【南九州市頰娃町牧之内(谷場)②・頰娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】
 【南さつま市加世田内山田(東山)②、枕崎市別府(中原)②、日置市伊集院町古城(飯牟礼)②】
 北薩：川内川中流域・霧島山麓 1,472ha 6地点 10ほ場 【さつま町船木(舟木)②、出水市平和町②、霧島市溝辺町麓(論地)②、霧島市牧園町三体堂②、曾於市末吉町岩崎②】
 大隅：大隅中南部 1,912ha 4地点 8ほ場 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②、鹿屋市東原町②、錦江町城元②】
 県計(熊毛・大島除く) 7,949ha (R6) 18地点34ほ場
 ※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。