

普通期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（８月下旬）

(No. 1) 調査年月日：2026年 8月12 ～ 20日

																						生育 ステージ	節伸～出穂期（一部）
病虫害名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)		程度別発生面積率 (%)					年次別発生面積率 (%)										記 事	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
〇いもち病	少	少	南 薩	127	10	27				10	90	20	60	10	20	0	30	50	10	20	50	少：伊集院1、国分1、湧水2、宮之城2 祁答院1、菱刈田中2、大口木崎1	
			北薩平坦	314	5	21				5	95	33	33	4	33	8	42	38	9	0	5		
			北薩山間	1,907	44	35				44	56	36	36	32	14	41	55	68	10	20	35		
			大 隅	0	0	40					100	50	83	50	33	17	83	0	50	33	0		
			県 計	2,348	17	29				17	83	36	46	21	27	19	52	41	17	13	17		
〇紋枯病	やや少	やや少	南 薩	127	10	16				10	90	10	40	10	0	20	0	20	20	20	20	少：川辺勝目1、始良1、隼人1	
			北薩平坦	628	10	16				10	90	13	25	8	29	8	4	25	14	20	15		
			北薩山間	0	0	6					100	23	9	5	5	5	0	9	5	5	0		
			大 隅	0	0	15					100	17	17	17	17	0	17	33	0	17	17		
			県 計	755	5	13				5	95	16	20	9	18	7	5	21	9	15	11		
縞葉枯病	並	並	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			北薩平坦	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			北薩山間	0	0	0					100	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0		
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			県 計	0	0	0					100	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0		
ばか苗病	やや多	多	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	少：川内宮崎1、始良2、隼人1	
			北薩平坦	1,256	20	4				20	80	0	0	0	8	8	0	4	0	0	10		
			北薩山間	0	0	1					100	0	9	0	0	0	0	0	0	5	0		
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			県 計	1,256	9	2				9	91	0	3	4	4	0	4	2	0	1	4		
心枯線虫病	やや少	やや少	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			北薩平坦	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			北薩山間	0	0	1					100	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5		
			大 隅	0	0	2					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17		
			県 計	0	0	0.7					100	1	1	0	0	0	0	0	0	1	3		
ごま葉枯病	並	並	南 薩	508	40	42				40	60	60	60	40	30	60	0	20	30	70	50	中：高尾野1 少：川辺古殿2、川辺勝目1、伊集院1、始良2、 隼人1、国分2、川内宮崎1、川内高江1、 高尾野1、中津川1、祁答院1、末吉1、大隅1	
			北薩平坦	2,826	45	41			5	40	55	29	58	38	58	38	13	54	59	25	35		
			北薩山間	477	11	29				11	89	18	45	50	50	9	0	45	30	15	30		
			大 隅	1,573	67	43				67	33	67	50	33	0	100	17	50	33	17	67		
			県 計	5,384	38	38			2	36	62	36	53	40	42	42	8	48	43	24	40		

栽培面積：南薩 1,270 ha 北薩平坦 6,280 ha 北薩山間 4,290 大隅 2,360 ha 平年は2016～2025の平均値。

注１）「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注２）「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

南 薩：南九州市知覧町 永里（２）・川辺町 古殿（２）・川辺町 勝目（２）、日置市伊集院町 大田（２）、いちき串木野市 大里（２）・・・調査ほ場数： 10

北薩平坦：蒲生町 楠田（２）、始良市 三拾町（２）、隼人町 住吉（２）、霧島市国分 上小川（２）、薩摩川内市 宮崎（２）・高江（２）・入来浦之名（2）

阿久根市 鶴川内（２）、高尾野町 東干拓（２）・六月田（2）・・・調査ほ場数：20

北薩山間：さつま町 宮之城時吉（２）・鶴田町大角（2）・中津川（２）、薩摩川内市 祁答院町上手（２）

伊佐市菱刈 前目（２）・田中（２）、伊佐市大口木崎（２）・山野（2）、湧水町 北方（２）・・・調査ほ場数：20

大 隅：曾於市末吉町（２）・大隅町 笠木（２）、鹿屋市野里（２）・・・調査ほ場数：6

県 計 巡回調査地点数：27地点、調査ほ場数：54

普通期水稻病虫害発生予察巡回調査月報（８月下旬）

(No. 2) 調査年月日：2026年 8月12 ～ 20日

																						生育 ステージ	節伸～出穂期（一部）
病虫害名	総合 概評	概評	地 域	発生面積 (ha)	発生面積率 (%)		程度別発生面積率 (%)					年次別発生面積率 (%)										記 事	
					本年	平年	甚	多	中	少	無	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
ヒメトビウカ	並	並	南 薩	254	20	36				20	80	50	40	100	30	10	10	10	30	40	40	少：川辺古殿1、市来1、蒲生2、始良1、入来2、高尾野1、出水1、湧水1、鶴田1、祁答院1、菱刈田中1、鹿屋1、末吉2	
			北薩平坦	2,198	35	32				35	65	0	58	58	29	29	4	17	36	35	50		
			北薩山間	953	22	33				22	78	9	64	50	41	18	14	27	15	45	45		
			大 隅	1,180	50	43				50	50	67	67	83	50	0	17	17	17	67	50		
			県 計	4,585	32	35				32	68	19	60	65	36	19	10	19	26	44	48		
マダノヨコバネイ	並	並	南 薩	508	40	40				40	60	20	40	40	40	20	40	20	60	60	60	少：知覧1、川辺勝目2、伊集院1、蒲生1、始良2、隼人2、高江2、入来1、阿久根1、湧水1、宮之城1、祁答院1、菱刈前目2、大口山野2、鹿屋2、末吉2、大隅1	
			北薩平坦	2,826	45	37				45	55	25	38	50	29	25	13	21	32	75	65		
			北薩山間	1,668	39	44				39	61	36	68	45	18	36	0	45	45	75	65		
			大 隅	1,967	83	65				83	17	67	100	100	83	67	0	50	33	67	83		
			県 計	6,969	49	44				49	51	35	58	57	38	35	9	33	38	72	67		
オヒビイロウカ	やや少	やや少	南 薩	0	0	27					100	70	80	10	20	50	0	10	0	10	20	少：出水1	
			北薩平坦	314	5	28				5	95	58	54	0	58	38	0	17	23	5	25		
			北薩山間	0	0	28					100	64	77	0	45	50	5	14	25	0	5		
			大 隅	0	0	42					100	100	100	0	100	33	0	17	0	17	50		
			県 計	314	2	30				2	98	68	72	1	59	42	1	15	17	6	23		
コゴブノメイガ	多	多	南 薩	1,270	100	47	10	10	50	30		50	40	10	60	40	0	80	60	90	40	甚：川辺勝目1、蒲生1、始良1、国分1、阿久根2、宮之城1、中津川1、大口木崎1 多：川辺勝目1、蒲生1、隼人1、出水1、宮之城1 中津川1、末吉1	
			北薩平坦	6,280	100	43	25	15	45	15		21	17	13	50	83	0	79	55	80	30		
			北薩山間	4,290	100	33	17	11	28	44		36	5	0	41	82	0	55	25	40	45		
			大 隅	2,360	100	57		17	33	50		67	33	17	83	100	0	67	33	100	67		
			県 計	14,200	100	43	17	14	38	31		36	19	10	55	82	0	70	43	72	41		
イカリカミシ	並	並	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	少：末吉1	
			北薩平坦	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0		
			北薩山間	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			大 隅	393	17	10				17	83	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0		
			県 計	393	3	2				3	97	0	0	0	10	0	0	2	9	0	0		
イモソウギセリ	やや少	やや少	南 薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			北薩平坦	0	0	1					100	0	4	0	0	0	0	0	5	0	0		
			北薩山間	0	0	1					100	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0		
			大 隅	0	0	7					100	0	0	17	50	0	0	0	0	0	0		
			県 計	0	0	2					100	0	3	3	10	1	0	0	2	0	0		
ナガレコガ	並	やや多	南 薩	127	10	3				10	90	0	10	0	0	0	0	0	0	0	20	少：市来1、高尾野1、湧水1、菱刈前目1	
			北薩平坦	314	5	2				5	95	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10		
			北薩山間	477	11	8				11	89	14	5	0	0	0	0	0	0	25	40		
			大 隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			県 計	918	6	4				6	94	4	2	0	0	0	0	0	0	12	18		

栽培面積： 南薩 1,270 ha 北薩平坦 6,280 ha 北薩山間 4,290 大隅 2,360 ha 平年は2016～2025の平均値。

注１）「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値(平年値)から統計的に評価したものである。

注２）「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。

※ 巡回調査地点名及び調査ほ場数

南 薩：南九州市知覧町 永里（２）・川辺町 古殿（２）・川辺町 勝目（２）、日置市伊集院町 大田（２）、いちき串木野市 大里（２）・・・調査ほ場数： 10

北薩平坦：蒲生町 楠田（２）、始良市 三拾町（２）、隼人町 住吉（２）、霧島市国分 上小川（２）、薩摩川内市 宮崎（２）・高江（２）・入来浦之名（２）

阿久根市 鶴川内（２）、高尾野町 東干拓（２）・六月田（２）・・・調査ほ場数：20

北薩山間：さつま町 宮之城時吉（２）・鶴田町大角（２）・中津川（２）、薩摩川内市 祁答院町上手（２）

伊佐市菱刈 前目（２）・田中（２）、伊佐市大口木崎（２）・山野（２）、湧水町 北方（２）・・・調査ほ場数：20

大 隅：曾於市末吉町（２）・大隅町 笠木（２）、鹿屋市野里（２）・・・調査ほ場数：6

県 計 巡回調査地点数：27地点、調査ほ場数：54