大島地域　　サトウキビ病害虫発生予察巡回調査月報（８月）　　令和８年８月３～21日調査

作物名	病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積(ha)	発生ほ場率（%）			発生程度（%）					年次別　発生ほ場率（%）										発病・発生数（%，頭，枚）						備　　考
						本年	前年	平年	甚	多	中	少	無	’16	’17	’18	’19	’20	’21	’22	’23	’24	’25			本年	前年	評価	平年	
サトウキビ	葉焼病	**並**	並	奄美	1,572	20	20	25				20	80	40	30	16	16	16	14	32	42	26	20	５茎当り病斑面積	奄美	0.1	0.5	やや少	(1.0)	奄美大島：少４　徳之島：少４
		並	並	熊毛	0	0	0	2					100	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	５茎当り病斑面積	熊毛	0.0	0.0	並	(0.002)	
サトウキビ	バッタ類	**多**	多	奄美	5,306	68	38	44		3		65	33	40	70	62	50	36	24	34	38	46	38	20株当り食害面積	奄美	2.4	3.9	やや多	(1.6)	奄美大島：少１　喜界島：少３ 徳之島：多１、少10 沖永良部島：少７　与論島：少５
		並	並	熊毛	0	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20株当り食害面積	熊毛	0.0	0.0	並	(0.0)	

※その他特記事項

●調査地点

奄美地域40ほ場調査【奄美大島５，喜界島５，徳之島15，沖永良部10，与論島５】　熊毛地域５ほ場調査【種子島５】

但し，メイチュウ類については奄美地域80ほ場調査【奄美大島10、喜界島10、徳之島30、沖永良部島20、与論島10】　熊毛地域10ほ場調査【種子島10】

ツマジロクサヨトウについては奄美地域45ほ場調査【奄美大島５，喜界島10，徳之島15，沖永良部島10，与論島５】　熊毛地域５ほ場調査【種子島５】

※　栽培面積：奄美地域7,860ha（夏植え:781ha、春植え:1,043ha、株出し:5,403ha、新植夏植え:633ha）　熊毛地域2,492ha（夏植え:172ha、春植え:403ha、株出し:1,765ha、新植夏植え:153ha）

（「令和６年産さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」（令和７年９月　県農産園芸課）から出典）

※表中の「総合概評」は，「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。