

茶樹 病虫害発生予察巡回調査月報

2026年（令和8年）8/12～20日調査

病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%、頭、枚)					備 考
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25			本年	評価	平年	
○炭疽病	やや少	並	南薩	2,283	50	53				50	50	25	38	44	44	76	65	47	65	63	63	1㎡当り	南薩	1.6	少	(13.0)	少：谷場1、菊永1、後岳1、枕崎2、東山2、川辺1、さつま1、出水1、末吉2、野井倉1、原田1、鹿屋1
		少	北薩	589	40	83				40	60	90	70	80	90	80	100	90	80	90	60	病葉数	北薩	4.8	少	(12.0)	
		並	大隅	717	38	41				38	63	75	13	38	13	63	75	50	25	38	25		大隅	2.5	並	(4.5)	
		やや少	県計	3,588	45	56				45	55	49	37	49	45	74	74	56	58	62	53		県平均	2.7	少	(10.6)	
輪斑病	少	やや少	南薩	856	19	32				19	81	6	50	13	13	59	35	29	29	44	38	1㎡当り	南薩	2.6	並	(2.2)	少：谷場1、後岳1、伊集院1、さつま1
		少	北薩	147	10	56				10	90	70	50	50	50	70	50	60	40	80	40	病葉数	北薩	0.2	少	(5.7)	
		少	大隅	0	0	34					100	38	0	25	50	63	50	50	13	38	13		大隅	0.0	少	(2.3)	
		少	県計	1,003	13	37				13	87	26	38	22	29	62	42	40	27	49	32		県平均	1.3	やや少	(3.2)	
もち病	並	並	南薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0	並	(0)	
		並	北薩	0	0	5					100	0	30	0	0	20	0	0	0	0	0	病葉数	北薩	0	並	(0.2)	
		並	大隅	0	0	1					100	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0	並	(0.1)	
		並	県計	0	0	1					100	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0		県平均	0	並	(0.1)	
○網もち病	やや少	並	南薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1㎡当り	南薩	0	並	(0.00)	
		やや少	北薩	0	0	4					100	0	0	0	10	20	0	10	0	0	0	病葉数	北薩	0.0	並	(0.2)	
		並	大隅	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		大隅	0	並	(0)	
		やや少	県計	0	0	1					100	0	0	0	2	3	0	2	0	0	0		県平均	0.0	並	(0.05)	
○チャノコカク モンハマキ	やや少	やや少	南薩	0	0	5					100	0	0	25	6	6	0	12	0	0	0	1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.3)	少：錦江1
		やや少	北薩	0	0	13					100	20	0	0	20	10	40	20	20	0	0	虫数	北薩	0.0	やや少	(0.8)	
		並	大隅	239	13	9				13	88	13	0	0	25	38	0	0	0	0	13		大隅	0.1	並	(0.1)	
		やや少	県計	239	3	7				3	97	7	0	14	13	14	7	10	4	0	3		県平均	0.0	やや少	(0.4)	
○チャハマキ	並	やや少	南薩	0	0	4					100	0	6	6	6	0	0	6	12	0	6	1㎡当り	南薩	0.0	やや少	(0.0)	少：錦江2
		やや少	北薩	0	0	4					100	20	0	0	0	0	0	0	10	0	10	虫数	北薩	0	並	(0.1)	
		並	大隅	478	25	20				25	75	0	25	0	38	50	13	25	13	0	38		大隅	0.5	並	(0.5)	
		並	県計	478	6	8				6	94	4	10	4	13	12	3	9	12	0	14		県平均	0.12	並	(0.2)	
○チャノホソガ	並	並	南薩	571	13	18				13	88	6	6	25	25	18	41	12	29	13	6	1㎡当り	南薩	0.4	並	(2.1)	少：枕崎1、川辺1、末吉2、鹿屋1、錦江2
		少	北薩	294	20	36				20	80	40	30	20	50	30	50	40	40	20	40	巻葉数	北薩	1.7	やや少	(2.8)	
		やや多	大隅	717	38	24				38	63	0	38	0	38	25	50	25	25	0	38		大隅	0.8	並	(0.9)	
		並	県計	1,582	20	23				20	80	11	18	18	33	22	45	20	30	11	20		県平均	0.9	やや少	(2.1)	

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2026年（令和8年）8/12～20日調査

病害虫名	総合 概評	概評	地域	発生 面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)					年次別 発生ほ場率 (%)										発病・発生数 (%、頭、枚)					備 考
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25			本年	評価	平年	
○ チャノミドリ ヒメヨコバイ	多	多	南薩	3,424	75	43				75	25	13	6	63	50	24	35	59	65	63	50	4ヶ所叩き 落とし虫数	南薩	2.4	多	(1.2)	中：末吉1、錦江1 少：谷場1、青戸1、菊永2、後岳2、 枕崎1、東山2、川辺2、 伊集院1、さつま2、出水2、 溝辺1、牧園2、末吉1、原田2、 鹿屋1、錦江1
		多	北薩	1,325	90	52			10	80	10	30	30	90	60	40	30	50	50	50	90		北薩	4.0	やや多	(2.9)	
		並	大隅	1,195	63	50			13	50	38	13	63	50	50	38	25	63	25	75	100		大隅	2.6	やや多	(1.7)	
		多	県計	5,944	75	46			5	70	25	16	25	64	52	30	32	58	52	63	69		県平均	2.9	やや多	(1.8)	
○ チャノキイロ アザミウマ	並	やや少	南薩	2,853	63	75				63	38	50	81	94	81	59	47	82	82	88	88	4ヶ所叩き 落とし虫数	南薩	3.6	やや少	(9.4)	中：溝辺1 少：青戸1、菊永1、後岳1、枕崎2、 東山1、川辺2、伊集院2、 さつま2、出水1、溝辺1、 牧園2、野井倉2、末吉2、 原田2、鹿屋1、錦江2
		やや多	北薩	1,325	90	77			10	80	10	100	90	70	80	90	60	90	60	60	70		北薩	11.5	やや多	(7.6)	
		並	大隅	1,673	88	79				88	13	38	75	75	88	88	50	88	88	100	100		大隅	7.1	並	(7.7)	
		並	県計	5,851	74	76			2	72	26	56	81	85	83	71	50	85	80	85	87		県平均	6.8	並	(8.5)	
○ カンザワハダニ	多	多	南薩	4,280	94	37		6	31	56	6	38	38	44	50	41	6	65	24	19	50	寄生葉率	南薩	10.7	多	(3.3)	多：川辺1、溝辺1、末吉2 中：谷場2、後岳1、枕崎1、伊集院1、 さつま1、溝辺1、牧園1、野井倉1 少：青戸2、菊永2、後岳1、枕崎1、 東山2、川辺1、さつま、牧園1、 野井倉1、原田2、鹿屋2
		多	北薩	1,178	80	53		30	30	20	20	40	60	40	50	50	40	60	50	70	70		北薩	21.3	多	(5.6)	
		多	大隅	1,434	75	45			13	63	25	63	25	50	63	38	38	63	13	50	50		大隅	5.1	並	(4.8)	
		多	県計	6,891	87	42		9	27	51	13	44	39	45	53	42	20	63	26	36	54		県平均	12.5	多	(4.3)	
クワシロ カイガラムシ	やや少	少	南薩	0	0	7					100	0	4	15	15	14	8	10	2	3	3	寄生株率	南薩	0.0	やや少	(2.4)	中：錦江1 少：牧園1、末吉1、錦江3 ※ クワシロカイガラムシは1地点4ほ場調査
		やや少	北薩	147	10	26				10	90	30	0	33	33	40	27	40	30	30	0		北薩	1.5	やや少	(15.5)	
		並	大隅	478	25	22			6	19	75	8	0	17	21	25	25	29	25	44	25		大隅	5.0	並	(4.4)	
		やや少	県計	625	8	14			2	6	92	8	2	18	20	21	15	20	13	18	8		県平均	1.6	やや少	(6.7)	
ヨモギ エダシヤク	やや少	やや少	南薩	0	0	3					100	6	0	13	0	0	0	0	0	0	6	※発生の 有無のみ	南薩		-	-	有：牧園1
		並	北薩	147	10	12				10	90	0	17	0	0	10	10	20	30	10	20		北薩		-	-	
		やや少	大隅	0	0	9					100	13	17	25	13	0	0	13	0	0	13		大隅		-	-	
		やや少	県計	147	2	6				2	98	7	7	13	3	2	2	7	5	2	10		県平均		-	-	
マダラカサハラハムシ	多	多	南薩	1,141	25	6				25	75				6	0	0	12	18	6	0	1㎡当たり 被害芽数	南薩	0.3	やや多	(0.2)	中：牧園1 少：菊永1、枕崎1、東山1、 伊集院1、さつま1、溝辺1、 牧園1、鹿屋1
		多	北薩	589	40	21			10	30	60				30	30	20	20	30	20	0		北薩	7.9	多	(2.0)	
		やや多	大隅	239	13	7				13	88				13	13	0	13	13	0	0		大隅	2.3	多	(0.2)	
		多	県計	1,969	25	9			2	23	75				12	8	4	13	19	7	0		県平均	3.0	多	(0.7)	
チャトゲコナジラミ	並	やや多	南薩	1,141	25	16				25	75	-	-	-	-	-	-	-	29	19	0	寄生葉率	南薩	0.4	並	(0.7)	中：末吉2 少：後岳2、枕崎1、川辺1、牧園2、 原田1、錦江2
		やや少	北薩	589	40	47			20	20	60	-	-	-	-	-	-	-	50	40	50		北薩	4.9	並	(6.2)	
		やや少	大隅	478	25	29				25	75	-	-	-	-	-	-	-	38	25	25		大隅	1.5	やや少	(2.8)	
		並	県計	2,208	28	25			4	24	72	-	-	-	-	-	-	-	35	24	15		県平均	2.0	やや少	(2.8)	

南薩：薩摩中南部 4、565ha

8地点161ほ場

【南九州市頤娃町牧之内(谷場)②・頤娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】

【南さつま市加世田内山田(東山)②、枕崎市別府(中原)②、日置市伊集院町古城(飯牟礼)②】

北薩：川内川中流域・霧島山麓 1,472ha 5地点 10ほ場 【さつま町船木(舟木)②、出水市平和町②、霧島市溝辺町麓(論地)②、霧島市牧園町三体堂②、曾於市末吉町岩崎②】

大隅：大隅中南部 1,912ha

4地点 81ほ場

【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②、鹿屋市東原町②、錦江町城元②】

県計(熊毛・大島除く) 7,949ha (R6) 18地点341ほ場

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。