

令和8年 8月		野菜病害虫発生予察巡回調査月報 ー露地ー																				調査年月日		令和8年 (2026年 8月13日～19日)					
作物名	作型	栽培面積 ha		病害虫名	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度別ほ場率 (%)					発生ほ場率 (%)										調査 ほ場数	記 事			
								本年	平年	甚	多	中	少	無	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25					
サトイモ	早掘・普通	249	精査	○ 疫病	やや多	並	174	70	61		20	10	40	30	-	-	100	67	92	50	50	50	20	60	計 10	宮之城:中1、少2、串良:多2、少2			
				○ ハスモンヨトウ	並	やや少	125	50	78				30	20	50	100	75	90	100	100	57	57	36	90			70	南九州市知覧町 2	南九州:少2、串良:中3
				アブラムシ類	-	-	50	20	-					20	80	-	-	-	-	-	-	21	60	60			さつま町 4		
			達観	モザイク病		並	0	0	0						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	鹿屋市串良町 4			
				セスジスズメ類		やや少	25	10	29					10	90	50	67	0	22	46	29	14	7	40	20				
				その他																									
根深ネギ	春まき	141	精査	べと病	-	-	0	0	-					100	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8	計 12				
				さび病	-	-	0	0	-					100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0			0		
				黒斑病	-	-	47	33	-		8	8	17	67	-	-	-	-	-	-	-	-	42	25					
				アブラムシ類	-	-	0	0	-					100	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0					
				ネギコガ	-	-	12	8	-				8	92	-	-	-	-	-	-	-	-	17	8					
				ネギハモグリバエ	-	-	24	17	-		8		8	83	-	-	-	-	-	-	-	-	50	67					
				○ アザミウマ類	-	-	71	50	-		8	8	33	50	-	-	-	-	-	-	-	-	0	17					
				○ ハスモンヨトウ	-	-	47	33	-				33	67	-	-	-	-	-	-	-	-	8	25					
			達観	シロイチモジヨトウ	-	-	12	8	-				8	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	42				
				白絹病	-	-	47	33	-				33	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8				
				軟腐病	-	-	12	8	-				8	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	8				
				疫病	-	-	0	0	-					100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0				
				その他																									
																								主な品種：夏扇4号，夏の宝山 生育時期：茎葉伸長期					

注1)「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値（平年値）から統計的に評価したものである。

注2)「総合概評」は、上記「概評」に発生度を加味して評価したものである。

注3)「達観」は発生が確認された場合、発生の有無のみの調査である。

注4)○：予報に掲載。