大島地域　　サトウキビ病害虫発生予察巡回調査月報（10月）　　令和８年10月７～19日調査

作物名	病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積(ha)	発生ほ場率(%) 本年	発生ほ場率(%) 平年	発生程度(%) 甚	多	中	少	無	年次別 発生ほ場率(%) '16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	発病・発生数(%，頭，枚)		本年	評価	平年	備　考
サトウキビ	葉焼病	やや少	やや少	奄美	983	13	18				13	88	12	14	14	10	10	18	20	32	16	32	５茎当り病斑面積	奄美	0.0	やや少	(1.7)	奄美大島：少５
		並	並	熊毛	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	５茎当り病斑面積	熊毛	0.0	並	(0.0)	
サトウキビ	さび病	やや多	多	奄美	1,376	18	5				18	83	0	0	0	0	0	8	14	14	8	8	５茎当り病斑面積	奄美	0.0	並	(0.1)	奄美大島：少２　徳之島：少２
		多	多	熊毛	2,492	100	24				100		0	0	0	0	0	0	40	40	60	100	５茎当り病斑面積	熊毛	4.0	並	(7.5)	種子島：少５
サトウキビ	メイチュウ類	多	やや多	奄美	2,293	29	22	1		1	26	71	21	19	4	12	15	36	29	27	20	40	20株当り被害茎率	奄美	1.0	多	(0.6)	奄美大島：少４　喜界島：少２ 徳之島：甚１、中１、少９ 与論島：少４
		やや少	並	熊毛	249	10	16				10	90	30	10	0	0	20	20	10	20	10	40	20株当り被害茎率	熊毛	0.1	並	(0.2)	種子島：少１
サトウキビ	ツマジロクサヨトウ	やや多	やや多	奄美	1,223	16	9			2	13	84							10	17	3	5	20株当り新葉部被害率	奄美	1.1	多	(0.3)	奄美大島：少１　徳之島：中１、少５
		並	並	熊毛	0	0	0					100							0	0	0	0	20株当り新葉部被害率	熊毛	0.0	並	(0.0)	

※その他特記事項

●調査地点

奄美地域40ほ場調査【奄美大島５、喜界島５、徳之島15、沖永良部10、与論島５】　熊毛地域５ほ場調査【種子島５】

但し、メイチュウ類については奄美地域72ほ場調査【奄美大島10、喜界島10、徳之島25、沖永良部島20、与論島７】　熊毛地域10ほ場調査【種子島10】

（メイチュウ類：徳之島及び与論島については、新植夏植の植付時期が遅く調査可能ほ場が少なかったため、調査ほ場数を変更（徳之島：通常30ほ場→25ほ場、与論島：通常10ほ場→７ほ場））

ツマジロクサヨトウについては奄美地域45ほ場調査【奄美大島５、喜界島10、徳之島15、沖永良部島10、与論島５】　熊毛地域５ほ場調査【種子島５】

※　栽培面積：奄美地域7,860ha（夏植え:781ha、春植え:1,043ha、株出し:5,403ha、新植夏植え:633ha）　　熊毛地域2,492ha（夏植え:172ha、春植え:403ha、株出し:1,765ha、新植夏植え:153ha）

（「令和６年産さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」（令和７年９月　県農産園芸課）から出典）

※表中の「総合概評」は，「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。