茶樹　　病害虫発生予察巡回調査月報　　2026年（令和8年）10/7～22日調査

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積(ha)	発生ほ場率(%) 本年	発生ほ場率(%) 平年	発生程度(%) 甚	多	中	少	無	年次別 発生ほ場率(%) '16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	発病・発生数(%、頭、枚)		本年	評価	平年	備考
炭疽病	並	やや少	南薩	1,997	44	53				44	56	25	38	38	63	65	76	71	59	50	50	1㎡当り	南薩	1.4	やや少	(12.4)	中：溝辺1、鹿屋1
		少	北薩	883	60	81			10	50	40	80	80	80	80	90	80	100	80	70	70	病葉数	北薩	15.4	並	(16.1)	少：谷場2、後岳2、枕崎1、東山1、川辺1、溝辺1、牧園2、末吉2
		やや多	大隅	956	50	41			13	38	50	50	38	38	38	50	50	50	38	25	38		大隅	15.3	多	(6.2)	野井倉1、原田2、
		やや少	県計	3,836	48	55			5	43	52	41	45	45	60	65	71	71	58	48	51		県平均	8.8	やや少	(12.0)	
輪斑病	やや少	並	南薩	571	13	18				13	88	19	6	6	13	18	41	0	24	44	6	1㎡当り	南薩	0.1	やや少	(0.6)	少：後岳1、川辺1、溝辺1、牧園2
		やや少	北薩	442	30	46				30	70	30	30	40	70	60	40	60	60	30	40	病葉数	北薩	2.0	並	(1.8)	
		少	大隅	0	0	18					100	0	25	25	13	13	25	25	0	25	25		大隅	0.0	やや少	(1.0)	
		やや少	県計	1,012	13	23				13	87	16	15	17	23	23	37	17	25	37	17		県平均	0.6	やや少	(1.0)	
新梢枯死症	並	やや多	南薩	856	19	12				19	81	13	19	0	6	24	24	6	0	6	25	発症梢数	南薩	0.8	やや多	(0.4)	少：谷場1、青戸1、後岳1、さつま1、野井倉1、原田2、鹿屋1
		少	北薩	147	10	52				10	90	40	80	30	50	50	50	50	40	60	70		北薩	0.2	少	(2.5)	
		多	大隅	956	50	23				50	50	38	13	13	38	25	13	13	13	38	25		大隅	1.6	多	(0.6)	
		並	県計	1,959	25	22				25	75	24	28	9	22	28	26	16	10	24	33		県平均	0.8	並	(1.0)	
網もち病	やや少	やや少	南薩	0	0	9					100	6	0	6	6	18	24	0	0	6	25	1㎡当り	南薩	0.0	やや少	(1.0)	少：原田1
		やや少	北薩	0	0	17					100	0	20	0	50	10	30	20	20	20	0	病葉数	北薩	0.0	やや少	(0.7)	
		多	大隅	239	13	1				13	88	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0		大隅	0.1	多	(0.0)	
		やや少	県計	239	3	9				3	97	4	4	4	13	15	19	4	4	7	14		県平均	0.0	やや少	(0.7)	
チャノコカクモンハマキ	並	並	南薩	285	6	5				6	94	0	0	6	6	0	6	0	18	13	0	1㎡当り	南薩	0.1	並	(0.1)	少：谷場1
		やや少	北薩	0	0	4					100	10	0	0	0	0	20	10	0	0	0	虫数	北薩	0.0	並	(0.3)	
		やや少	大隅	0	0	6					100	13	13	0	0	0	0	13	25	0	0		大隅	0.0	やや少	(0.3)	
		並	県計	285	4	5				4	96	5	3	4	4	0	7	5	16	7	0		県平均	0.0	やや少	(0.2)	
チャハマキ	多	多	南薩	856	19	7			6	13	81	6	13	6	6	18	12	0	0	13	0	1㎡当り	南薩	0.7	多	(0.2)	中：谷場1
		並	北薩	147	10	8				10	90	0	0	0	20	10	0	0	10	10	30	虫数	北薩	0.3	並	(0.7)	少：谷場1、枕崎1、溝辺1
		やや多	大隅	478	25	14				25	75	0	0	38	25	13	13	13	13	13	13		大隅	0.5	並	(0.7)	
		多	県計	1,481	19	9			4	15	81	4	7	13	13	15	10	3	5	12	9		県平均	0.5	並	(0.5)	
チャノホソガ	やや少	やや少	南薩	285	6	9				6	94	6	13	6	6	6	12	12	12	13	6	1㎡当り	南薩	0.1	並	(0.8)	少；枕崎1、溝辺1、野井倉1、鹿屋1、錦江1
		少	北薩	147	10	40				10	90	40	40	40	40	40	60	30	60	20	30	巻葉数	北薩	0.4	やや少	(7.0)	
		並	大隅	717	38	28				38	63	0	25	0	13	63	25	25	63	0	63		大隅	0.4	並	(3.1)	
		やや少	県計	1,150	14	19				14	86	11	21	11	14	26	24	18	33	11	24		県平均	0.3	やや少	(3.1)	
チャノミドリヒメヨコバイ	多	多	南薩	3,709	81	38				81	19	63	31	31	38	29	24	53	41	38	38	4ヶ所叩き	南薩	2.5	多	(0.9)	中：溝辺1
		やや多	北薩	1,030	70	50			10	60	30	60	40	20	50	80	40	50	70	50	40	落とし虫数	北薩	2.9	多	(1.5)	少：谷場2、青戸2、菊永1、後岳2、枕崎2、東山2、川辺2、さつま2、出水1、溝辺1、末吉2、野井倉2、原田2、鹿屋2、錦江2
		多	大隅	1,912	100	46				100		50	38	50	50	75	13	25	75	50	38		大隅	1.9	やや多	(1.3)	
		多	県計	6,651	84	42			2	82	16	59	34	34	43	49	24	46	55	43	38		県平均	2.5	多	(1.2)	
チャノキイロアザミウマ	並	やや多	南薩	1,997	44	31				44	56	50	25	44	19	29	0	24	29	63	31	4ヶ所叩き	南薩	1.1	並	(1.3)	少：谷場1、青戸2、菊永1、後岳1、川辺1、伊集院1、出水1、末吉2、原田1、錦江2
		少	北薩	442	30	44				30	70	60	50	30	40	50	40	50	50	30	40	落とし虫数	北薩	0.8	やや少	(1.5)	
		やや少	大隅	717	38	56				38	63	63	50	63	38	63	75	25	75	63	50		大隅	1.0	やや少	(4.6)	
		並	県計	3,156	40	40				40	60	55	36	46	27	41	26	29	44	57	37		県平均	1.0	やや少	(2.1)	

茶樹　　病害虫発生予察巡回調査月報　　2026年（令和8年）10/7～22日調査

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積(ha)	発生ほ場率(%) 本年	発生ほ場率(%) 平年	発生程度(%) 甚	多	中	少	無	年次別 発生ほ場率(%) '16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25	発病・発生数(%、頭、枚)		本年	評価	平年	備考
○ カンザワハダニ	多	多	南薩	2,853	63	34			13	50	38	19	38	25	25	29	53	47	53	38	19	寄生葉率	南薩	3.6	並	(2.2)	中：菊永1、東山1、溝辺1 少：谷場1、青戸2、後岳1、枕崎1、東山1、川辺1、伊集院1、出水2、牧園2、溝辺1、原田2、鹿屋2、錦江1
		やや多	北薩	883	60	47			10	50	40	40	40	10	60	40	60	90	30	30	70		北薩	4.0	並	(3.2)	
		やや多	大隅	1,195	63	45				63	38	13	38	38	63	38	88	13	75	50	38		大隅	2.4	並	(1.9)	
		多	県計	4,931	**62**	**39**			9	53	38	21	38	25	41	33	63	47	54	39	33		県平均	3.4	並	(2.4)	
クワシロカイガラムシ	やや少	少	南薩	143	3	31	3				97	27	46	44	44	41	31	29	22	22	6	寄生株率	南薩	3.1	やや少	(11.1)	甚：谷場1 中：錦江1 少：錦江1
		少	北薩	0	0	40					100	37	40	30	80	57	53	67	17	15	0		北薩	0.0	やや少	(15.7)	
		やや少	大隅	478	25	37			13	13	75	38	25	58	63	50	42	25	29	19	25		大隅	5.6	並	(8.3)	
		少	県計	621	8	**34**	2		3	3	92	31	40	45	55	46	38	35	23	20	10		県平均	2.8	やや少	(11.8)	
ヨモギエダシャク	やや少	やや少	南薩	0	0	2					100	0	6	6	0	6	0	0	6	0	0	※発生の有無のみ	南薩	－	－	－	
		並	北薩	0	0	3					100	0	0	0	0	20	0	0	0	10	0		北薩	－	－	－	
		やや少	大隅	0	0	8					100	0	0	25	0	0	13	13	25	0	0		大隅	－	－	－	
		やや少	県計	0	0	**4**					100	0	4	10	0	7	3	3	9	2	0		県平均	－	－	－	
チャトゲコナジラミ	やや多	やや多	南薩	1,712	38	22				38	63	－	－	－	－	－	－	－	24	38	6	寄生葉率	南薩	0.9	やや多	(0.5)	中：末吉2 少：後岳1、枕崎2、東山2、川辺1、錦江2
		少	北薩	442	30	50			20	10	70	－	－	－	－	－	－	－	50	60	40		北薩	4.1	やや少	(5.5)	
		並	大隅	478	25	25				25	75	－	－	－	－	－	－	－	25	25	25		大隅	0.8	少	(2.1)	
		並	県計	2,631	33	**28**			4	29	67	－	－	－	－	－	－	－	29	39	17		県平均	1.8	やや少	(2.3)	

※その他特記事項

南薩：薩摩中南西部 4,565ha　8地点16ほ場　【南九州市頴娃町牧之内(谷場)②・頴娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】
【南さつま市加世田内山田(東山)②、枕崎市別府(中原)②、日置市伊集院町古城(飯牟礼)②】

北薩：川内川中流域･霧島山麓 1,472ha　5地点 10ほ場　【さつま町船木(舟木)②、出水市平和町②、霧島市溝辺町麓(論地)②、霧島市牧園町三体堂②、曽於市末吉町岩崎②】

大隅：大隅中南部 1,912ha　4地点 8ほ場　【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②、鹿屋市東原町②、錦江町城元②】

県計(熊毛・大島除く)　7,949ha（R6）18地点34ほ場

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」や「発生程度」を加味したものである。