大島地域　　サトウキビ病害虫発生予察巡回調査月報（11月）　　令和８年11月５～19日調査

作物名	病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積(ha)	発生ほ場率(%)		発生程度(%)					年次別　発生ほ場率(%)										発病・発生数(%，頭，枚)					備　　考
						本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25			本年	評価	平年	
サトウキビ	カンシャコバネナガカメムシ	少	少	奄美	3,144	40	58				40	60	62	58	48	48	48	70	62	68	52	68	５葉当り吸汁痕数	奄美	0.2	やや少	(1.4)	奄美大島：少２　徳之島：少８ 沖永良部島：少５　与論島：少１
		並	並	熊毛	498	20	28				20	80	0	100	0	0	0	0	20	0	60	100	５葉当り吸汁痕数	熊毛	0.04	やや少	(0.9)	種子島：少１
サトウキビ	メイチュウ類	並	並	奄美	3,832	49	50		1	5	43	51	56	40	24	29	59	57	65	61	50	56	20株当り被害茎率	奄美	1.4	やや少	(1.8)	奄美大島：少５　喜界島：少７ 徳之島：　中３、少９ 沖永良部島：多１，中１、少９ 与論島：少４
		やや少	やや少	熊毛	498	20	30				20	80	30	30	10	20	10	30	20	40	50	60	20株当り被害茎率	熊毛	0.3	並	(0.4)	種子島：少２
サトウキビ	ツマジロクサヨトウ	並	多	奄美	699	9	3				9	91								2	3	5	20株当り新葉部被害率	奄美	0.01	やや少	(0.05)	徳之島：少４
		並	並	熊毛	0	0	0					100								0	0	0	20株当り新葉部被害率	熊毛	0	並	(0)	

※その他特記事項

●調査地点

奄美地域40ほ場調査【奄美大島５、喜界島５、徳之島15、沖永良部10、与論島５】　熊毛地域５ほ場調査【種子島５】

但し、メイチュウ類については奄美地域80ほ場調査【奄美大島10、喜界島10、徳之島30、沖永良部島20、与論島10】　熊毛地域10ほ場調査【種子島10】

ツマジロクサヨトウについては奄美地域45ほ場調査【奄美大島５、喜界島10、徳之島15、沖永良部島10、与論島５】　熊毛地域５ほ場調査【種子島５】

※　栽培面積：奄美地域7,860ha（夏植え:781ha、春植え:1,043ha、株出し:5,403ha、新植夏植え:633ha）　熊毛地域2,492ha（夏植え:172ha、春植え:403ha、株出し:1,765ha、新植夏植え:153ha）

（「令和６年産さとうきび及び甘しゃ糖生産実績」（令和７年９月　県農産園芸課）から出典）

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数（率）」の発生程度を加味したものである。