令和８年 11月　　野菜病害虫発生予察巡回調査月報 －露地 －

調査年月日	令和８年　　（2026年 11月 9日～16日）

作物名	作型	栽培面積 ha		病害虫名	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%) 本年	発生ほ場率 (%) 平年	発生程度別ほ場率（%） 甚	多	中	少	無	発生ほ場率（%） 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	調査ほ場数		記事
ハクサイ	早まき・普通	241	精査	軟腐病	－	－	90	**38**	－				38	63	－	－	－	－	－	－	－	－	－	75	13	計	8	霧島:少3
				アブラムシ類	－	－	60	**25**	－				25	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	25	0			曽於:少2
				ヨトウガ	－	－	60	**25**	－				25	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	0	曽於市	4	霧島:少2
				ハスモンヨトウ	－	－	60	**25**	－				25	75	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	13	霧島市(協力員)	4	曽於:少1、霧島:少1
				コナガ	－	－	0	**0**	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	50	13			
			達観	白斑病		－	0	**0**	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0			
				べと病		－	121	**50**	－				50	50	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	13			霧島:4
				黒斑病		－	0	**0**	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	13	0			
				モザイク病		－	0	**0**	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	0			
				ハイマダラノメイガ		－	0	**0**	－					100	－	－	－	－	－	－	－	－	－	0	13			
				その他																								主な品種：黄楽70、晴黄 生育時期：曽於:結球初期 霧島:結球初期～収穫期
キャベツ	冬どり	733	精査	軟腐病	並	並	0	**0**	0					100	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	計	12	
				黒腐病	やや少	やや少	0	**0**	5					100	0	6	0	8	0	0	0	0	8	17	8			
				○ 菌核病	やや少	やや少	0	**0**	5					100	6	6	0	25	0	6	0	0	0	0	8	山川	4	
				○ コナガ	**並**	やや多	183	**25**	13				25	75	61	39	17	42	8	28	0	17	8	0	0	溝辺	4	山川:少3、溝辺:成虫が散見されるほ場あり
				ハスモンヨトウ	多	多	244	**33**	12			**17**	17	67	0	0	0	0	25	11	0	8	0	8	42	串良	4	山川:中1少1、串良:中1少1
				シロイチモジヨトウ	多	多	305	**42**	3			**8**	33	58	－	11	0	17	0	0	0	0	0	0	8			山川:中1少2、串良:少2
				オオタバコガ	並	並	61	**8**	6				8	92	6	6	0	17	0	6	0	8	0	0	17			山川:少1
				ヨトウガ	多	多	61	**8**	2				8	92	0	0	0	0	0	6	8	0	0	0	0			山川:少1
				モンシロチョウ	多	多	122	**17**	5				17	83	11	17	0	17	0	11	0	0	0	8	0			山川:少1、溝辺:少1
				チョウ目害虫被害	少	少	0	**0**	68					100	－	－	－	－	75	61	33	75	67	75	92			
				アブラムシ類	並	並	0	**0**	1					100	33	11	0	0	0	0	0	0	0	8	0			
			達観	モザイク病		並	0	**0**	1					100	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0			
				べと病		やや多	61	**8**	5				8	92	0	17	0	17	0	11	0	0	0	0	8			溝辺:1
				タバコガ		並	0	**0**	3					100	6	0	0	8	17	0	0	0	0	0	0			
				その他																								主な品種：しずはま，彩里，夢ごろも 生育時期：山川：結球初期～収穫期 溝辺：結球初期 串良：結球初期

注1)「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値（平年値）から統計的に評価したものである。
注2)「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。
注3)「達観」は発生が確認された場合、発生の有無のみの調査である。
注4) ○：予報に掲載。

令和８年 11月　　野菜病害虫発生予察巡回調査月報 －露地 －

調査年月日	令和８年　　（2026年 11月 9日～16日）

作物名	作型	栽培面積 ha		病害虫名	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%) 本年	発生ほ場率 (%) 平年	発生程度別ほ場率（%） 甚	多	中	少	無	発生ほ場率（%） 15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	調査ほ場数	記事
エンドウ類	冬・春どり	479		菌核病	並	並	0	**0**	1					100	－	－	－	－	－	0	0	5	0	0	0	計 16	
				○ 褐紋・褐斑病	並	やや多	30	**6**	3				6	94	0	0	42	0	0	13	0	5	0	6	0	山川 8	山川:少1
				さび病	並	並	0	**0**	0					100	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0	0	阿久根 4	
			精	○ うどんこ病	並	並	60	**13**	14				13	88	0	0	0	0	8	13	13	50	0	13	19	垂水 4	山川:少2
				ハスモンヨトウ	多	多	150	**31**	3				31	69	17	8	0	0	0	0	0	20	0	0	0		阿久根:少1、垂水:少4
				シロイチモジヨトウ	多	多	180	**38**	2				38	63	0	0	8	0	0	6	0	0	0	6	6	うち調査協力員	山川:少1、阿久根:少2、垂水:少3
				オオタバコガ	多	多	90	**19**	1				19	81	0	8	0	0	0	0	0	0	6	0	0	山川 4	山川:少3
			査	ヨトウガ	並	並	0	**0**	3					100	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0		
				ハモグリバエ類	少	少	0	**0**	16					100	50	0	33	25	8	25	6	35	13	13	0		
				○ アザミウマ類	やや少	少	120	**25**	49			**19**	6	75	50	50	42	42	50	38	38	60	75	44	44		山川:中2少1、垂水:中1
				立枯性病害		やや多	30	**6**	3				6	94	17	8	0	0	0	6	6	5	0	6	0		垂水:1
			達	タバコガ類		やや少	0	**0**	2					100	0	0	0	8	0	0	6	0	0	0	0		
				ウラナミシジミ		やや多	90	**19**	10				19	81	0	8	0	8	0	6	19	35	13	0	0		山川:1、垂水:2
			観	その他																							主な品種：ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾘｰﾝ, まめこぞう, ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳ 生育時期：山川:開花期～収穫期 阿久根:本葉2～5枚 垂水:収穫期 山川:ウワバ類の被害を認めた

注1)「概評」は、本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値（平年値）から統計的に評価したものである。
注2)「総合概評」は、上記「概評」に発生程度を加味して評価したものである。
注3)「達観」は発生が確認された場合、発生の有無のみの調査である。
注4)○：予報に掲載。