

伊集院保健所感染症情報

2026年第24週（令和8年6月8日～令和8年6月14日）

【お問い合わせ先】 〒899-2501 鹿児島県日置市伊集院町下谷口 1960-1 鹿児島地域振興局保健福祉環境部（伊集院保健所）

TEL (099) 273-2332 / FAX (099) 272-5674 / E-mail kago-kenko-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

鹿児島地域振興局 URL <http://www.pref.kagoshima.jp/ak01/chiiki/kagoshima/index.html>

● 定点把握感染症

管内流行発生注意報発令：水痘

管内流行発生警報発令：伝染性紅斑

管内流行発生警報発令中：咽頭結膜熱、A群溶血性レンサ球菌咽頭炎、手足口病、ヘルパンギーナ

定点医療機関【ARI2（インフルエンザ・COVID）、小児科1、基幹定点1】

疾患名	警報基準値		注意報	伊集院保健所管内					県	
	開始	終息	基準値	第21週	第22週	第23週	第24週	先週からの増減	第23週	前週からの増減
ARI（急性呼吸器感染症）	—	—	—	84.50	81.50	85.00	92.50	↗	45.12	↗
インフルエンザ	30	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	→	0.00	↘
COVID-19	—	—	—	0.50	0.00	3.00	3.50	↗	2.05	↗
咽頭結膜熱	3	1	—	3.00	3.00	2.00	1.00	↘	1.32	↘
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	8	4	—	11.00	9.00	10.00	8.00	↘	1.77	↘
感染性胃腸炎	20	12	—	0.00	0.00	0.00	0.00	→	3.61	↘
水痘	2	1	1	0.00	0.00	0.00	1.00	↗	0.13	↘
手足口病	5	2	—	36.00	26.00	38.00	34.00	↘	11.35	↗
伝染性紅斑	2	1	—	1.00	0.00	1.00	2.00	↗	0.35	↗
突発性発しん	—	—	—	0.00	1.00	0.00	0.00	→	0.32	↘
ヘルパンギーナ	6	2	—	7.00	5.00	4.00	4.00	→	1.87	↗
流行性耳下腺炎	6	2	3	0.00	1.00	0.00	0.00	→	0.00	↘
RSウイルス感染症	—	—	—	1.00	0.00	1.00	0.00	↘	1.32	↗

※警報域：太文字で赤色の塗りつぶし、注意報域：太文字で黄色の塗りつぶし

● TOPIC

6月21日（日）～27日（土）はハンセン病問題を正しく理解する週間です！

ハンセン病問題に対する解決の促進を図るために、県では「ハンセン病問題を正しく理解する週間」を定めています。誤った隔離政策によって、強制的に隔離され、ご本人だけでなく、ご家族も偏見や差別を受け、多くの方々のかけがえのない人生が奪われました。

病気が治っても家族の元へは帰れず、社会復帰が難しい状況にあり、今もなお、多くの方々が、療養所での生活を余儀なくされています。


長い間、偏見や差別に苦しめられたハンセン病であった方々や家族が平穏に安心して生活できる地域づくりのために、また、二度とこのような悲しい歴史を繰り返さないために、私たち一人ひとりがハンセン病問題とは何かを正しく理解することが大切です。

*鹿児島県ホームページ「ハンセン病問題を正しく理解するために」をご覧ください。



● 注意すべき感染症

・水痘（流行発生注意報発令！）




第24週の伊集院保健所管内における水痘の報告数は、1人でした。年齢別では、15～19歳（1人）でした。水痘とは、いわゆる「みずぼうそう」のことで、これは水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる発疹性の病気です。感染から2週間程度の潜伏期間を経て発疹が現れます。臨床経過は一般に軽症で、倦怠感、掻痒感、38℃前後の発熱が2～3日間続く程度です。典型的な症例では、発疹は紅斑（皮膚の表面が赤くなること）から始まり、水疱（水ぶくれ）を経て痂皮化（かさぶたになること）して治癒します。

感染経路には、空気感染や飛沫感染、水疱の内容物との接触による接触感染などがあり、発疹が出現する1～2日前からすべての水疱が痂皮化するまで感染力があります。

予防方法としてはワクチン接種が推奨されています。周囲に患者がいる場合は、患者との接触を避け、手洗いを励行しましょう。

・伝染性紅斑（流行発生警報発令中）



第24週の伊集院保健所管内における伝染性紅斑の報告数は、3歳・6歳（各1人）定点当たり2.00でした。

伝染性紅斑は、ヒトパルボウイルスB19による感染症です。小児を中心にみられる流行性の発疹性の病気です。両頬がリンゴのように赤くなることから、「リンゴ病」と呼ばれることもあります。

10～20日の潜伏期間の後、微熱やかぜの症状などがみられ、その後、両頬に蝶の羽のような境界鮮明な赤い発疹（紅斑）が現れます。発疹は1週間程度で消失します。感染経路は、飛まつ感染や、接触感染です。

伝染性紅斑に感染したことの無い女性が妊娠中に感染した場合、胎児にも感染し、胎児水腫などの重篤な状態や、流産のリスクとなる可能性があります。熱や倦怠感が出現した後に発疹が出るなど、伝染性紅斑を疑う症状がある場合は、医療機関に相談しましょう。

予防方法として、患者と濃厚接触を避け、手洗い、咳エチケットなどの一般的な予防法を励行しましょう。

○学校における感染症による出席停止の状況6/8～6/14（出典：学校等欠席者・感染症情報システム）

今週は、溶連菌感染症1人、COVID-19の8人報告がありました。

自治体名	疾患名	溶連菌感染症	新型コロナウイルス感染症
日置市		1	1
いちき串木野市		0	7
三島村		0	0
十島村		0	0
計		1	8