

南薩地域感染症危機管理情報ネットワーク

(NISE)

NISE(ナイス)：Nansatsu Infectious Diseases Surveillance of Epidemiology

2026
第 34 週
令和 8 年
8/17～8/23

【お問合せ先】 南薩地域振興局保健福祉環境部（加世田保健所）
〒897-0001 鹿児島県南さつま市加世田村原二丁目1-1
TEL：0993-53-2316 / FAX：0993-53-4519 / E-mail：minami-kenkou-shippei@pref.kagoshima.lg.jp

管内で増加傾向にある感染症はありません。

徳之島保健所管内では、インフルエンザの発生報告が増加しているようです（定点当たり12.67）。
公立小・中学校では、間もなく新学期を迎えます。規則正しい生活習慣を心がけるとともに、手洗いや咳エチケットなど、基本的な感染対策をしっかりと行いましょう。

1. 定点報告疾患の発生状況

疾 患 名	警 報		注意報 基準値	対象	29週	30週	31週	32週	33週	34週
	開始基準値	終息基準値								
急性呼吸器感染症(ARI)	—	—	—	加世田	48.00	53.00	43.50	43.00	24.50	39.50
				指 宿	45.50	16.00	30.50	33.50	15.00	29.50
				県	58.47	44.33	46.18	47.14	37.67	—
インフルエンザ	30.00	10.00	10.00	加世田	—	—	—	—	—	—
				指 宿	0.50	—	—	—	—	0.50
				県	0.33	0.07	0.12	0.16	0.54	1.58
COVID-19	—	—	—	加世田	6.00	1.00	1.50	0.50	0.50	0.50
				指 宿	8.50	1.50	4.00	2.50	1.00	1.50
				県	8.47	3.28	2.21	2.02	1.19	0.67
RSウイルス感染症	—	—	—	加世田	—	1.00	—	1.00	1.00	2.00
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	2.26	1.61	2.19	2.00	1.61	1.10
咽頭結膜熱	3.00	1.00	—	加世田	—	—	—	—	—	1.00
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	0.77	0.65	0.48	0.52	0.65	0.45
A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎	8.00	4.00	—	加世田	4.00	—	1.00	1.00	—	—
				指 宿	3.00	—	3.00	3.00	3.00	2.00
				県	1.65	1.32	1.84	2.16	1.77	1.29
感染性胃腸炎	20.00	12.00	—	加世田	8.00	2.00	4.00	3.00	3.00	8.00
				指 宿	3.00	1.00	6.00	6.00	1.00	6.00
				県	2.74	2.87	2.90	2.84	2.06	2.97
水痘	2.00	1.00	1.00	加世田	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	0.23	0.29	0.23	0.35	0.13	0.26
手足口病	5.00	2.00	—	加世田	2.00	—	1.00	—	—	—
				指 宿	8.00	3.00	1.00	1.00	—	1.00
				県	2.16	1.39	0.48	0.58	0.23	0.29
伝染性紅斑	2.00	1.00	—	加世田	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	0.23	0.13	0.10	0.13	—	0.13
突発性発しん	—	—	—	加世田	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	0.52	0.29	0.29	0.42	0.23	0.45
ヘルパンギーナ	6.00	2.00	—	加世田	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	1.00	—	—	—	—
				県	0.19	0.19	0.16	0.13	0.19	0.19
流行性耳下腺炎	6.00	2.00	3.00	加世田	—	—	—	—	—	—
				指 宿	—	—	—	—	—	—
				県	0.03	0.10	—	0.06	—	0.03

※鹿児島県のARI報告数は来週報以降に反映されます。また、データは後日訂正されることがあります。

2. 警報・注意報の状況

（流行発生警報・注意報の基準値を超えた感染症）

警報発令中

加世田： なし
指 宿： なし
県： なし

注意報発令中

加世田： なし
指 宿： なし
県： なし

3. 全数報告疾患の発生状況

（管内全ての医療機関から届出のあった一～五類感染症）

第 34 週（8/17～8/23）

届出なし


4. 南薩地域で注目すべき感染症

※人数は定点医からの報告です。全体の患者数ではありませんので、ご注意ください。




急性呼吸器感染症（ARI）

第34週の報告数は、加世田保健所管内で79人（定点当たり39.50）でした。
指宿保健所管内では、59人（定点当たり29.50）でした。
南薩地域内での年齢別報告数は、1～4歳（65人）、5～9歳（38人）、10～14歳（13人）の順に多く報告されています。




COVID-19

第34週の報告数は、加世田保健所管内で1人（定点当たり0.50）でした。
指宿管内では、3人（定点当たり1.50）でした。
県全体では、38人（定点当たり0.67）でした。



感染性胃腸炎

第34週の報告数は、加世田保健所管内で8人（定点当たり8.00）でした。
指宿管内では、6人（定点当たり6.00）でした。
県全体では、92人（定点当たり2.97）でした。



今週の
話題

浸水した家屋の感染症対策 ～消毒編～

先週に引き続き、浸水した家屋での感染症対策として、今週は消毒薬の選び方について紹介します。

■主な消毒薬と使用方法

○次亜塩素酸ナトリウム

汚染の程度がひどい場合、長時間浸水していた場合に使います。

○アルコール、塩化ベンザルコニウム

色褪せ、腐食などにより次亜塩素酸ナトリウムが使用できない場合に使います。

消毒薬	対象と使い方		希釈方法（例）
	食器類・流し台・浴槽	家具類・床	
次亜塩素酸ナトリウム (家庭用塩素系漂白剤でも可)	0.02%に希釈する ①食器用洗剤と水で洗う。 ②希釈した消毒液に5分間漬けるか、消毒薬を含ませた布で拭き、その後、水洗い・水拭きする。 ③よく乾燥させる。	0.1%に希釈する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。 ③金属面や木面など色褪せが気になる場所は、水で2度拭きする。	※商品によって濃度が異なりますので、商品パッケージの説明に従って希釈してください。 5%消毒薬の場合 ※キャップ1杯：4～5ml ■0.02%希釈方法 1Lの水+消毒薬をペットボトルキャップ1杯分 ■0.1%希釈方法 1Lの水+消毒薬をペットボトルキャップ4～5杯分
消毒用アルコール	希釈せず、原液のまま使用する ①洗剤と水で洗う。 ②アルコールを含ませた布で拭く。 ※70%以上のアルコール濃度のものを使用すること ※火気のあるところでは使用しない	希釈せず、原液のまま使用する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②アルコールを含ませた布で拭く。 ※70%以上のアルコール濃度のものを使用すること ※火気のあるところでは使用しない	
10%塩化ベンザルコニウム (逆性石けん)	0.1%に希釈する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。	0.1%に希釈する ①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭きしてから、十分に乾燥させる。 ②調整した液を浸した布などでよく拭く。	10%消毒薬の場合 ※キャップ1杯：4～5ml ■0.1%希釈方法 水1L+消毒薬をペットボトルキャップ2杯分

※消毒作業をする際は、ゴム手袋、長靴、ゴーグル等を着用し、作業が終わったらしっかりと手を洗いましょう。

※消毒効果を十分発揮するためには、消毒前の清掃が重要です。清掃作業時における注意事項については、先週のNISEコラムを参照ください。

参考：被災した家屋での感染症対策 | 厚生労働省