

令和5年度 秋冬期・春期におけるチャ冬芽耐凍性獲得温度(曾於地域)

本データは、志布志市有明町，曾於市末吉町，曾於市財部町の現地茶園で調査した結果です。

3月4日現在での上位芽の耐凍温度

志布志市有明町(野神立本)

「ゆたかみどり」：-3℃ 「さえみどり」：-3℃ 「やぶきた」：-7℃

志布志市有明町(野神鍋)

「ゆたかみどり」：-3℃ 「さえみどり」：-3℃ 「やぶきた」：-7℃

曾於市末吉町(岩崎丸山)

「さえみどり」：-3℃ 「やぶきた」：-7℃

曾於市財部町(十文字)

「さえみどり」：-3℃ 「やぶきた」：-7℃

●秋冬期の冬芽の凍害対策

早生品種(「ゆたかみどり」, 「さえみどり」, 「あさつゆ」)や中切りした「やぶきた」等では、秋冬期に凍害を受けやすく、芽つぶれを起こす茶園がみられます。

- ・秋冬期の防霜が必要な期間は、初霜期から平均気温が10℃を恒常的に下回る12月末まで。
- ・防霜ファンの稼働開始温度の設定は、耐凍温度より2～4℃高めで設定して下さい。

県農業開発総合センター茶業部ホームページ情報も参考にして下さい。

<http://www.pref.kagoshima.jp/ag16/taitousei/r05taitousei.html>

耐凍性調査結果（詳細データ）

表1 志布志市有明町(野神立本)における上位芽の冬芽の耐凍温度

年	月	日	耐凍性 検定温度 (°C)	検定温度での凍害率 (%)			耐凍温度 (°C)		
				ゆたかみどり	さえみどり	やぶきた	ゆたかみどり	さえみどり	やぶきた
2024	3月	4日	-2	6%	1%				
			-3	4%	0%		-3	-3	
			-5			5%			
			-7			8%			-7

表2 志布志市有明町(野神鍋)における上位芽の冬芽の耐凍温度

年	月	日	耐凍性 検定温度 (°C)	検定温度での凍害率 (%)			耐凍温度 (°C)		
				ゆたかみどり	さえみどり	やぶきた	ゆたかみどり	さえみどり	やぶきた
2024	3月	4日	-2	2%	0%				
			-3	0%	0%		-3	-3	
			-5			3%			
			-7			0%			-7

表3 曾於市末吉町(岩崎丸山)における上位芽の冬芽の耐凍温度

年	月	日	耐凍性 検定温度 (°C)	検定温度での凍害率 (%)		耐凍温度 (°C)	
				さえみどり	やぶきた	さえみどり	やぶきた
2024	3月	4日	-2	0%			
			-3	1%		-3	
			-5		3%		
			-7		7%		-7

表4 曾於市財部町(十文字)における上位芽の冬芽の耐凍温度

年	月	日	耐凍性 検定温度 (°C)	検定温度での凍害率 (%)		耐凍温度 (°C)	
				さえみどり	やぶきた	さえみどり	やぶきた
2024	3月	4日	-2	3%			
			-3	5%		-3	
			-5		5%		
			-7		5%		-7

注1：耐凍性検定温度とは、プログラム付き低温庫内で徐々に温度を低下させ表示の検定温度に3時間遭遇させたもの。

注2：耐凍温度凍害率が10%以下になった温度。

(参考)

曾於地域における上位芽の耐凍温度（2023年）

単位：℃

年	月 日	志布志市有明町(野神)			曾於市末吉町(岩崎)	
		ゆたかみどり	さえみどり	やぶきた	さえみどり	やぶきた
2023	1月10日	-11	-11	-13	-12	-11
	1月16日	-13	-13	-14	-12	-12
	1月23日	-13	-14	-14	-12	-14
	1月30日	-15	-15	-15	-14	-15
	2月6日	-16	-16	-16	-14	-16
	2月20日	-7	-11	-11	-6	-10
	2月27日	-4	-4	-11	-4	-7
	3月6日	-4	-4	-8	-1	-8